

# Álgebra Linear Avançada

## Produto Tensorial de Transformações Lineares

Adriano Moura

Unicamp

2020

# A Definição

# A Definição

Dadas  $T_j \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_j, W_j)$ ,  $1 \leq j \leq k$

# A Definição

Dadas  $T_j \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_j, W_j)$ ,  $1 \leq j \leq k$ , considere a função  $k$ -linear

$$\psi : V_1 \times \cdots \times V_k \rightarrow W_1 \otimes \cdots \otimes W_k, \quad (v_1, \dots, v_k) \mapsto T_1(v_1) \otimes \cdots \otimes T_k(v_k)$$

# A Definição

Dadas  $T_j \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_j, W_j)$ ,  $1 \leq j \leq k$ , considere a função  $k$ -linear

$$\psi : V_1 \times \cdots \times V_k \rightarrow W_1 \otimes \cdots \otimes W_k, \quad (v_1, \dots, v_k) \mapsto T_1(v_1) \otimes \cdots \otimes T_k(v_k),$$

# A Definição

Dadas  $T_j \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_j, W_j)$ ,  $1 \leq j \leq k$ , considere a função  $k$ -linear

$$\psi : V_1 \times \cdots \times V_k \rightarrow W_1 \otimes \cdots \otimes W_k, \quad (v_1, \dots, v_k) \mapsto T_1(v_1) \otimes \cdots \otimes T_k(v_k),$$

e a transformação linear induzida

$$\tilde{\psi} : V_1 \otimes \cdots \otimes V_k \rightarrow W_1 \otimes \cdots \otimes W_k, \quad v_1 \otimes \cdots \otimes v_k \mapsto T_1(v_1) \otimes \cdots \otimes T_k(v_k).$$

# A Definição

Dadas  $T_j \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_j, W_j)$ ,  $1 \leq j \leq k$ , considere a função  $k$ -linear

$$\psi : V_1 \times \cdots \times V_k \rightarrow W_1 \otimes \cdots \otimes W_k, \quad (v_1, \dots, v_k) \mapsto T_1(v_1) \otimes \cdots \otimes T_k(v_k),$$

e a transformação linear induzida

$$\tilde{\psi} : V_1 \otimes \cdots \otimes V_k \rightarrow W_1 \otimes \cdots \otimes W_k, \quad v_1 \otimes \cdots \otimes v_k \mapsto T_1(v_1) \otimes \cdots \otimes T_k(v_k).$$

Assim, fica definida uma função

$$\varphi : \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, W_1) \times \cdots \times \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_k, W_k) \rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1 \otimes \cdots \otimes V_k, W_1 \otimes \cdots \otimes W_k),$$

## A Definição

Dadas  $T_j \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_j, W_j)$ ,  $1 \leq j \leq k$ , considere a função  $k$ -linear

$$\psi : V_1 \times \cdots \times V_k \rightarrow W_1 \otimes \cdots \otimes W_k, \quad (v_1, \dots, v_k) \mapsto T_1(v_1) \otimes \cdots \otimes T_k(v_k),$$

e a transformação linear induzida

$$\tilde{\psi} : V_1 \otimes \cdots \otimes V_k \rightarrow W_1 \otimes \cdots \otimes W_k, \quad v_1 \otimes \cdots \otimes v_k \mapsto T_1(v_1) \otimes \cdots \otimes T_k(v_k).$$

Assim, fica definida uma função

$$\begin{aligned} \varphi : \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, W_1) \times \cdots \times \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_k, W_k) &\rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1 \otimes \cdots \otimes V_k, W_1 \otimes \cdots \otimes W_k), \\ \varphi(T_1, \dots, T_k)(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k) &= T_1(v_1) \otimes \cdots \otimes T_k(v_k). \end{aligned}$$



# A Definição

Dadas  $T_j \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_j, W_j)$ ,  $1 \leq j \leq k$ , considere a função  $k$ -linear

$$\psi : V_1 \times \cdots \times V_k \rightarrow W_1 \otimes \cdots \otimes W_k, \quad (v_1, \dots, v_k) \mapsto T_1(v_1) \otimes \cdots \otimes T_k(v_k),$$

e a transformação linear induzida

$$\tilde{\psi} : V_1 \otimes \cdots \otimes V_k \rightarrow W_1 \otimes \cdots \otimes W_k, \quad v_1 \otimes \cdots \otimes v_k \mapsto T_1(v_1) \otimes \cdots \otimes T_k(v_k).$$

Assim, fica definida uma função

$$\begin{aligned} \varphi : \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, W_1) \times \cdots \times \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_k, W_k) &\rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1 \otimes \cdots \otimes V_k, W_1 \otimes \cdots \otimes W_k), \\ \varphi(T_1, \dots, T_k)(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k) &= T_1(v_1) \otimes \cdots \otimes T_k(v_k). \end{aligned}$$

Note que  $\varphi$  é  $k$ -linear

## A Definição

Dadas  $T_j \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_j, W_j)$ ,  $1 \leq j \leq k$ , considere a função  $k$ -linear

$$\psi : V_1 \times \cdots \times V_k \rightarrow W_1 \otimes \cdots \otimes W_k, \quad (v_1, \dots, v_k) \mapsto T_1(v_1) \otimes \cdots \otimes T_k(v_k),$$

e a transformação linear induzida

$$\tilde{\psi} : V_1 \otimes \cdots \otimes V_k \rightarrow W_1 \otimes \cdots \otimes W_k, \quad v_1 \otimes \cdots \otimes v_k \mapsto T_1(v_1) \otimes \cdots \otimes T_k(v_k).$$

Assim, fica definida uma função

$$\begin{aligned} \varphi : \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, W_1) \times \cdots \times \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_k, W_k) &\rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1 \otimes \cdots \otimes V_k, W_1 \otimes \cdots \otimes W_k), \\ \varphi(T_1, \dots, T_k)(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k) &= T_1(v_1) \otimes \cdots \otimes T_k(v_k). \end{aligned}$$

Note que  $\varphi$  é  $k$ -linear e, portanto, temos a transformação linear induzida

$$\begin{aligned} \tilde{\varphi} : \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, W_1) \otimes \cdots \otimes \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_k, W_k) &\rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1 \otimes \cdots \otimes V_k, W_1 \otimes \cdots \otimes W_k), \\ T_1 \otimes \cdots \otimes T_k &\mapsto \varphi(T_1, \dots, T_k). \end{aligned}$$

## A Definição

Dadas  $T_j \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_j, W_j)$ ,  $1 \leq j \leq k$ , considere a função  $k$ -linear

$$\psi : V_1 \times \cdots \times V_k \rightarrow W_1 \otimes \cdots \otimes W_k, \quad (v_1, \dots, v_k) \mapsto T_1(v_1) \otimes \cdots \otimes T_k(v_k),$$

e a transformação linear induzida

$$\tilde{\psi} : V_1 \otimes \cdots \otimes V_k \rightarrow W_1 \otimes \cdots \otimes W_k, \quad v_1 \otimes \cdots \otimes v_k \mapsto T_1(v_1) \otimes \cdots \otimes T_k(v_k).$$

Assim, fica definida uma função

$$\begin{aligned} \varphi : \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, W_1) \times \cdots \times \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_k, W_k) &\rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1 \otimes \cdots \otimes V_k, W_1 \otimes \cdots \otimes W_k), \\ \varphi(T_1, \dots, T_k)(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k) &= T_1(v_1) \otimes \cdots \otimes T_k(v_k). \end{aligned}$$

Note que  $\varphi$  é  $k$ -linear e, portanto, temos a transformação linear induzida

$$\begin{aligned} \tilde{\varphi} : \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, W_1) \otimes \cdots \otimes \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_k, W_k) &\rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1 \otimes \cdots \otimes V_k, W_1 \otimes \cdots \otimes W_k), \\ T_1 \otimes \cdots \otimes T_k &\mapsto \varphi(T_1, \dots, T_k). \end{aligned}$$

A transformação linear  $\tilde{\psi} = \varphi(T_1, \dots, T_k)$  será denotada por  $T_1 \otimes \cdots \otimes T_k$  e será chamada de o produto tensorial da família  $T_1, \dots, T_k$ .

# $\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1 \otimes \cdots \otimes V_k, W_1 \otimes \cdots \otimes W_k)$ é Produto Tensorial

Proposição 10.3.2 e Corolário 10.3.3

A transformação linear  $\tilde{\varphi}$  é injetora.

# $\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1 \otimes \cdots \otimes V_k, W_1 \otimes \cdots \otimes W_k)$ é Produto Tensorial

## Proposição 10.3.2 e Corolário 10.3.3

A transformação linear  $\tilde{\varphi}$  é injetora. Se as dimensões de  $V_j$  e  $W_j$  forem finitas para todo  $1 \leq j \leq k$ , então  $\tilde{\varphi}$  é isomorfismo.

# $\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1 \otimes \cdots \otimes V_k, W_1 \otimes \cdots \otimes W_k)$ é Produto Tensorial

## Proposição 10.3.2 e Corolário 10.3.3

A transformação linear  $\tilde{\varphi}$  é injetora. Se as dimensões de  $V_j$  e  $W_j$  forem finitas para todo  $1 \leq j \leq k$ , então  $\tilde{\varphi}$  é isomorfismo.

**Dem.:** A segunda afirmação segue da primeira já que domínio e contradomínio têm a mesma dimensão (finita).

# $\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1 \otimes \cdots \otimes V_k, W_1 \otimes \cdots \otimes W_k)$ é Produto Tensorial

## Proposição 10.3.2 e Corolário 10.3.3

A transformação linear  $\tilde{\varphi}$  é injetora. Se as dimensões de  $V_j$  e  $W_j$  forem finitas para todo  $1 \leq j \leq k$ , então  $\tilde{\varphi}$  é isomorfismo.

**Dem.:** A segunda afirmação segue da primeira já que domínio e contradomínio têm a mesma dimensão (finita).

Procedamos por indução em  $k \geq 2$ .

# $\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1 \otimes \cdots \otimes V_k, W_1 \otimes \cdots \otimes W_k)$ é Produto Tensorial

## Proposição 10.3.2 e Corolário 10.3.3

A transformação linear  $\tilde{\varphi}$  é injetora. Se as dimensões de  $V_j$  e  $W_j$  forem finitas para todo  $1 \leq j \leq k$ , então  $\tilde{\varphi}$  é isomorfismo.

**Dem.:** A segunda afirmação segue da primeira já que domínio e contradomínio têm a mesma dimensão (finita).

Procedamos por indução em  $k \geq 2$ . Para  $k = 2$ , tome  $\Gamma \in \mathcal{N}(\tilde{\varphi})$



# $\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1 \otimes \cdots \otimes V_k, W_1 \otimes \cdots \otimes W_k)$ é Produto Tensorial

## Proposição 10.3.2 e Corolário 10.3.3

A transformação linear  $\tilde{\varphi}$  é injetora. Se as dimensões de  $V_j$  e  $W_j$  forem finitas para todo  $1 \leq j \leq k$ , então  $\tilde{\varphi}$  é isomorfismo.

**Dem.:** A segunda afirmação segue da primeira já que domínio e contradomínio têm a mesma dimensão (finita).

Procedamos por indução em  $k \geq 2$ . Para  $k = 2$ , tome  $\Gamma \in \mathcal{N}(\tilde{\varphi})$  e escolha uma expressão para  $\Gamma$  da forma  $\Gamma = \sum_{j=1}^m T_j \otimes S_j$

# $\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1 \otimes \cdots \otimes V_k, W_1 \otimes \cdots \otimes W_k)$ é Produto Tensorial

## Proposição 10.3.2 e Corolário 10.3.3

A transformação linear  $\tilde{\varphi}$  é injetora. Se as dimensões de  $V_j$  e  $W_j$  forem finitas para todo  $1 \leq j \leq k$ , então  $\tilde{\varphi}$  é isomorfismo.

**Dem.:** A segunda afirmação segue da primeira já que domínio e contradomínio têm a mesma dimensão (finita).

Procedamos por indução em  $k \geq 2$ . Para  $k = 2$ , tome  $\Gamma \in \mathcal{N}(\tilde{\varphi})$  e escolha uma expressão para  $\Gamma$  da forma  $\Gamma = \sum_{j=1}^m T_j \otimes S_j$  com  $T_j \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, W_1)$  e  $S_j \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_2, W_2)$  tais que  $T_1, \dots, T_m$  e  $S_1, \dots, S_m$  sejam famílias l.i..

# $\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1 \otimes \cdots \otimes V_k, W_1 \otimes \cdots \otimes W_k)$ é Produto Tensorial

## Proposição 10.3.2 e Corolário 10.3.3

A transformação linear  $\tilde{\varphi}$  é injetora. Se as dimensões de  $V_j$  e  $W_j$  forem finitas para todo  $1 \leq j \leq k$ , então  $\tilde{\varphi}$  é isomorfismo.

**Dem.:** A segunda afirmação segue da primeira já que domínio e contradomínio têm a mesma dimensão (finita).

Procedamos por indução em  $k \geq 2$ . Para  $k = 2$ , tome  $\Gamma \in \mathcal{N}(\tilde{\varphi})$  e escolha uma expressão para  $\Gamma$  da forma  $\Gamma = \sum_{j=1}^m T_j \otimes S_j$  com  $T_j \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, W_1)$  e  $S_j \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_2, W_2)$  tais que  $T_1, \dots, T_m$  e  $S_1, \dots, S_m$  sejam famílias l.i..

Em particular,

$$(1) \quad \sum_{j=1}^m T_j(v) \otimes S_j(v') = 0 \quad \forall v \in V_1, v' \in V_2.$$

# $\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1 \otimes \cdots \otimes V_k, W_1 \otimes \cdots \otimes W_k)$ é Produto Tensorial

## Proposição 10.3.2 e Corolário 10.3.3

A transformação linear  $\tilde{\varphi}$  é injetora. Se as dimensões de  $V_j$  e  $W_j$  forem finitas para todo  $1 \leq j \leq k$ , então  $\tilde{\varphi}$  é isomorfismo.

**Dem.:** A segunda afirmação segue da primeira já que domínio e contradomínio têm a mesma dimensão (finita).

Procedamos por indução em  $k \geq 2$ . Para  $k = 2$ , tome  $\Gamma \in \mathcal{N}(\tilde{\varphi})$  e escolha uma expressão para  $\Gamma$  da forma  $\Gamma = \sum_{j=1}^m T_j \otimes S_j$  com  $T_j \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, W_1)$  e  $S_j \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_2, W_2)$  tais que  $T_1, \dots, T_m$  e  $S_1, \dots, S_m$  sejam famílias l.i..

Em particular,

$$(1) \quad \sum_{j=1}^m T_j(v) \otimes S_j(v') = 0 \quad \forall v \in V_1, v' \in V_2.$$

Se  $m \neq 0$ , então  $T_1 \neq 0$  e podemos escolher  $v \in V_1$  tal que  $T_1(v) \neq 0$ .

# $\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1 \otimes \cdots \otimes V_k, W_1 \otimes \cdots \otimes W_k)$ é Produto Tensorial

## Proposição 10.3.2 e Corolário 10.3.3

A transformação linear  $\tilde{\varphi}$  é injetora. Se as dimensões de  $V_j$  e  $W_j$  forem finitas para todo  $1 \leq j \leq k$ , então  $\tilde{\varphi}$  é isomorfismo.

**Dem.:** A segunda afirmação segue da primeira já que domínio e contradomínio têm a mesma dimensão (finita).

Procedamos por indução em  $k \geq 2$ . Para  $k = 2$ , tome  $\Gamma \in \mathcal{N}(\tilde{\varphi})$  e escolha uma expressão para  $\Gamma$  da forma  $\Gamma = \sum_{j=1}^m T_j \otimes S_j$  com  $T_j \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, W_1)$  e  $S_j \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_2, W_2)$  tais que  $T_1, \dots, T_m$  e  $S_1, \dots, S_m$  sejam famílias l.i..

Em particular,

$$(1) \quad \sum_{j=1}^m T_j(v) \otimes S_j(v') = 0 \quad \forall v \in V_1, v' \in V_2.$$

Se  $m \neq 0$ , então  $T_1 \neq 0$  e podemos escolher  $v \in V_1$  tal que  $T_1(v) \neq 0$ . Seja  $r$  a dimensão do subespaço de  $W_1$  gerado por  $T_1(v), \dots, T_m(v)$

# $\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1 \otimes \cdots \otimes V_k, W_1 \otimes \cdots \otimes W_k)$ é Produto Tensorial

## Proposição 10.3.2 e Corolário 10.3.3

A transformação linear  $\tilde{\varphi}$  é injetora. Se as dimensões de  $V_j$  e  $W_j$  forem finitas para todo  $1 \leq j \leq k$ , então  $\tilde{\varphi}$  é isomorfismo.

**Dem.:** A segunda afirmação segue da primeira já que domínio e contradomínio têm a mesma dimensão (finita).

Procedamos por indução em  $k \geq 2$ . Para  $k = 2$ , tome  $\Gamma \in \mathcal{N}(\tilde{\varphi})$  e escolha uma expressão para  $\Gamma$  da forma  $\Gamma = \sum_{j=1}^m T_j \otimes S_j$  com  $T_j \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, W_1)$  e  $S_j \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_2, W_2)$  tais que  $T_1, \dots, T_m$  e  $S_1, \dots, S_m$  sejam famílias l.i..

Em particular,

$$(1) \quad \sum_{j=1}^m T_j(v) \otimes S_j(v') = 0 \quad \forall v \in V_1, v' \in V_2.$$

Se  $m \neq 0$ , então  $T_1 \neq 0$  e podemos escolher  $v \in V_1$  tal que  $T_1(v) \neq 0$ .

Seja  $r$  a dimensão do subespaço de  $W_1$  gerado por  $T_1(v), \dots, T_m(v)$  e, a menos de re-ordenação, suponha que  $T_1(v), \dots, T_r(v)$  seja l.i..

Assim, para cada  $r < l \leq m$ , existem escalares  $a_{i,l}$ ,  $1 \leq i \leq r$ , tais que

$$T_l(v) = \sum_{i=1}^r a_{i,l} T_i(v).$$

Assim, para cada  $r < l \leq m$ , existem escalares  $a_{i,l}$ ,  $1 \leq i \leq r$ , tais que

$$T_l(v) = \sum_{i=1}^r a_{i,l} T_i(v).$$

Retornando estas expressões em (1), segue que

$$\sum_{j=1}^r T_j(v) \otimes \left( S_j(v') + \sum_{l=r+1}^m a_{j,l} S_l(v') \right) = 0 \quad \forall v' \in V_2.$$



Assim, para cada  $r < l \leq m$ , existem escalares  $a_{i,l}$ ,  $1 \leq i \leq r$ , tais que

$$T_l(v) = \sum_{i=1}^r a_{i,l} T_i(v).$$

Retornando estas expressões em (1), segue que

$$\sum_{j=1}^r T_j(v) \otimes \left( S_j(v') + \sum_{l=r+1}^m a_{j,l} S_l(v') \right) = 0 \quad \forall v' \in V_2.$$

Como  $T_1(v), \dots, T_r(v)$  é l.i., segue do Lema 10.2.7 que

$$S_j + \sum_{l=r+1}^m a_{j,l} S_l = 0 \quad \forall 1 \leq j \leq r.$$

Assim, para cada  $r < l \leq m$ , existem escalares  $a_{i,l}$ ,  $1 \leq i \leq r$ , tais que

$$T_l(v) = \sum_{i=1}^r a_{i,l} T_i(v).$$

Retornando estas expressões em (1), segue que

$$\sum_{j=1}^r T_j(v) \otimes \left( S_j(v') + \sum_{l=r+1}^m a_{j,l} S_l(v') \right) = 0 \quad \forall v' \in V_2.$$

Como  $T_1(v), \dots, T_r(v)$  é l.i., segue do Lema 10.2.7 que

$$S_j + \sum_{l=r+1}^m a_{j,l} S_l = 0 \quad \forall 1 \leq j \leq r.$$

Mas isso contradiz o fato de termos escolhido  $S_1, \dots, S_m$  l.i..

Assim, para cada  $r < l \leq m$ , existem escalares  $a_{i,l}$ ,  $1 \leq i \leq r$ , tais que

$$T_l(v) = \sum_{i=1}^r a_{i,l} T_i(v).$$

Retornando estas expressões em (1), segue que

$$\sum_{j=1}^r T_j(v) \otimes \left( S_j(v') + \sum_{l=r+1}^m a_{j,l} S_l(v') \right) = 0 \quad \forall v' \in V_2.$$

Como  $T_1(v), \dots, T_r(v)$  é l.i., segue do Lema 10.2.7 que

$$S_j + \sum_{l=r+1}^m a_{j,l} S_l = 0 \quad \forall 1 \leq j \leq r.$$

Mas isso contradiz o fato de termos escolhido  $S_1, \dots, S_m$  l.i.. Logo,  
 $m = 0$

Assim, para cada  $r < l \leq m$ , existem escalares  $a_{i,l}$ ,  $1 \leq i \leq r$ , tais que

$$T_l(v) = \sum_{i=1}^r a_{i,l} T_i(v).$$

Retornando estas expressões em (1), segue que

$$\sum_{j=1}^r T_j(v) \otimes \left( S_j(v') + \sum_{l=r+1}^m a_{j,l} S_l(v') \right) = 0 \quad \forall v' \in V_2.$$

Como  $T_1(v), \dots, T_r(v)$  é l.i., segue do Lema 10.2.7 que

$$S_j + \sum_{l=r+1}^m a_{j,l} S_l = 0 \quad \forall 1 \leq j \leq r.$$

Mas isso contradiz o fato de termos escolhido  $S_1, \dots, S_m$  l.i.. Logo,  $m = 0 \Rightarrow \Gamma = 0$ , completando a demonstração para  $k = 2$ .

Assim, para cada  $r < l \leq m$ , existem escalares  $a_{i,l}$ ,  $1 \leq i \leq r$ , tais que

$$T_l(v) = \sum_{i=1}^r a_{i,l} T_i(v).$$

Retornando estas expressões em (1), segue que

$$\sum_{j=1}^r T_j(v) \otimes \left( S_j(v') + \sum_{l=r+1}^m a_{j,l} S_l(v') \right) = 0 \quad \forall v' \in V_2.$$

Como  $T_1(v), \dots, T_r(v)$  é l.i., segue do Lema 10.2.7 que

$$S_j + \sum_{l=r+1}^m a_{j,l} S_l = 0 \quad \forall 1 \leq j \leq r.$$

Mas isso contradiz o fato de termos escolhido  $S_1, \dots, S_m$  l.i.. Logo,  $m = 0 \Rightarrow \Gamma = 0$ , completando a demonstração para  $k = 2$ .

Suponha então que  $k > 2$  e introduza a seguinte notação:

$$V = V_1 \otimes \cdots \otimes V_{k-1}, \quad W = W_1 \otimes \cdots \otimes W_{k-1},$$

Assim, para cada  $r < l \leq m$ , existem escalares  $a_{i,l}$ ,  $1 \leq i \leq r$ , tais que

$$T_l(v) = \sum_{i=1}^r a_{i,l} T_i(v).$$

Retornando estas expressões em (1), segue que

$$\sum_{j=1}^r T_j(v) \otimes \left( S_j(v') + \sum_{l=r+1}^m a_{j,l} S_l(v') \right) = 0 \quad \forall v' \in V_2.$$

Como  $T_1(v), \dots, T_r(v)$  é l.i., segue do Lema 10.2.7 que

$$S_j + \sum_{l=r+1}^m a_{j,l} S_l = 0 \quad \forall 1 \leq j \leq r.$$

Mas isso contradiz o fato de termos escolhido  $S_1, \dots, S_m$  l.i.. Logo,  $m = 0 \Rightarrow \Gamma = 0$ , completando a demonstração para  $k = 2$ .

Suponha então que  $k > 2$  e introduza a seguinte notação:

$$V = V_1 \otimes \cdots \otimes V_{k-1}, \quad W = W_1 \otimes \cdots \otimes W_{k-1},$$

$$\tilde{\varphi}_{k-1} : \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, W_1) \otimes \cdots \otimes \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_{k-1}, W_{k-1}) \rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$$

Assim, para cada  $r < l \leq m$ , existem escalares  $a_{i,l}$ ,  $1 \leq i \leq r$ , tais que

$$T_l(v) = \sum_{i=1}^r a_{i,l} T_i(v).$$

Retornando estas expressões em (1), segue que

$$\sum_{j=1}^r T_j(v) \otimes \left( S_j(v') + \sum_{l=r+1}^m a_{j,l} S_l(v') \right) = 0 \quad \forall v' \in V_2.$$

Como  $T_1(v), \dots, T_r(v)$  é l.i., segue do Lema 10.2.7 que

$$S_j + \sum_{l=r+1}^m a_{j,l} S_l = 0 \quad \forall 1 \leq j \leq r.$$

Mas isso contradiz o fato de termos escolhido  $S_1, \dots, S_m$  l.i.. Logo,  $m = 0 \Rightarrow \Gamma = 0$ , completando a demonstração para  $k = 2$ .

Suponha então que  $k > 2$  e introduza a seguinte notação:

$$V = V_1 \otimes \cdots \otimes V_{k-1}, \quad W = W_1 \otimes \cdots \otimes W_{k-1},$$

$\tilde{\varphi}_{k-1} : \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, W_1) \otimes \cdots \otimes \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_{k-1}, W_{k-1}) \rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$ , que é injetora por hipótese de indução

Assim, para cada  $r < l \leq m$ , existem escalares  $a_{i,l}$ ,  $1 \leq i \leq r$ , tais que

$$T_l(v) = \sum_{i=1}^r a_{i,l} T_i(v).$$

Retornando estas expressões em (1), segue que

$$\sum_{j=1}^r T_j(v) \otimes \left( S_j(v') + \sum_{l=r+1}^m a_{j,l} S_l(v') \right) = 0 \quad \forall v' \in V_2.$$

Como  $T_1(v), \dots, T_r(v)$  é l.i., segue do Lema 10.2.7 que

$$S_j + \sum_{l=r+1}^m a_{j,l} S_l = 0 \quad \forall 1 \leq j \leq r.$$

Mas isso contradiz o fato de termos escolhido  $S_1, \dots, S_m$  l.i.. Logo,  $m = 0 \Rightarrow \Gamma = 0$ , completando a demonstração para  $k = 2$ .

Suponha então que  $k > 2$  e introduza a seguinte notação:

$$V = V_1 \otimes \cdots \otimes V_{k-1}, \quad W = W_1 \otimes \cdots \otimes W_{k-1},$$

$\tilde{\varphi}_{k-1} : \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, W_1) \otimes \cdots \otimes \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_{k-1}, W_{k-1}) \rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$ , que é injetora por hipótese de indução, e

$$\tilde{\varphi}' : \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W) \otimes \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_k, W_k) \rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V \otimes V_k, W \otimes W_k),$$



Assim, para cada  $r < l \leq m$ , existem escalares  $a_{i,l}$ ,  $1 \leq i \leq r$ , tais que

$$T_l(v) = \sum_{i=1}^r a_{i,l} T_i(v).$$

Retornando estas expressões em (1), segue que

$$\sum_{j=1}^r T_j(v) \otimes \left( S_j(v') + \sum_{l=r+1}^m a_{j,l} S_l(v') \right) = 0 \quad \forall v' \in V_2.$$

Como  $T_1(v), \dots, T_r(v)$  é l.i., segue do Lema 10.2.7 que

$$S_j + \sum_{l=r+1}^m a_{j,l} S_l = 0 \quad \forall 1 \leq j \leq r.$$

Mas isso contradiz o fato de termos escolhido  $S_1, \dots, S_m$  l.i.. Logo,  $m = 0 \Rightarrow \Gamma = 0$ , completando a demonstração para  $k = 2$ .

Suponha então que  $k > 2$  e introduza a seguinte notação:

$$V = V_1 \otimes \cdots \otimes V_{k-1}, \quad W = W_1 \otimes \cdots \otimes W_{k-1},$$

$\tilde{\varphi}_{k-1} : \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, W_1) \otimes \cdots \otimes \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_{k-1}, W_{k-1}) \rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$ , que é injetora por hipótese de indução, e

$$\tilde{\varphi}' : \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W) \otimes \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_k, W_k) \rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V \otimes V_k, W \otimes W_k),$$

que é injetora pelo caso  $k = 2$ .

# Núcleo e Imagem

A associatividade de  $\otimes$  induz os seguintes isomorfismos:

$$\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, W_1) \otimes \cdots \otimes \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_k, W_k) \xrightarrow{\psi} \\ (\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, W_1) \otimes \cdots \otimes \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_{k-1}, W_{k-1})) \otimes \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_k, W_k),$$

# Núcleo e Imagem

A associatividade de  $\otimes$  induz os seguintes isomorfismos:

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, W_1) \otimes \cdots \otimes \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_k, W_k) &\xrightarrow{\psi} \\ (\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, W_1) \otimes \cdots \otimes \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_{k-1}, W_{k-1})) \otimes \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_k, W_k), \\ T_1 \otimes \cdots \otimes T_k &\mapsto (T_1 \otimes \cdots \otimes T_{k-1}) \otimes T_k, \end{aligned}$$

# Núcleo e Imagem

A associatividade de  $\otimes$  induz os seguintes isomorfismos:

$$\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, W_1) \otimes \cdots \otimes \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_k, W_k) \xrightarrow{\psi} \\ (\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, W_1) \otimes \cdots \otimes \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_{k-1}, W_{k-1})) \otimes \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_k, W_k), \\ T_1 \otimes \cdots \otimes T_k \mapsto (T_1 \otimes \cdots \otimes T_{k-1}) \otimes T_k,$$

$$\text{e } \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V \otimes V_k, W \otimes W_k) \xrightarrow{\psi'} \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1 \otimes \cdots \otimes V_k, W_1 \otimes \cdots \otimes W_k).$$

# Núcleo e Imagem

A associatividade de  $\otimes$  induz os seguintes isomorfismos:

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, W_1) \otimes \cdots \otimes \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_k, W_k) &\xrightarrow{\psi} \\ (\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, W_1) \otimes \cdots \otimes \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_{k-1}, W_{k-1})) \otimes \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_k, W_k), \\ T_1 \otimes \cdots \otimes T_k &\mapsto (T_1 \otimes \cdots \otimes T_{k-1}) \otimes T_k, \end{aligned}$$

e  $\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V \otimes V_k, W \otimes W_k) \xrightarrow{\psi'} \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1 \otimes \cdots \otimes V_k, W_1 \otimes \cdots \otimes W_k)$ .

Facilmente verifica-se que  $\tilde{\varphi} = \psi' \circ \tilde{\varphi}' \circ (\tilde{\varphi}_{k-1} \otimes \text{Id}) \circ \psi$ .

# Núcleo e Imagem

A associatividade de  $\otimes$  induz os seguintes isomorfismos:

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, W_1) \otimes \cdots \otimes \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_k, W_k) &\xrightarrow{\psi} \\ &(\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, W_1) \otimes \cdots \otimes \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_{k-1}, W_{k-1})) \otimes \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_k, W_k), \\ T_1 \otimes \cdots \otimes T_k &\mapsto (T_1 \otimes \cdots \otimes T_{k-1}) \otimes T_k, \end{aligned}$$

e  $\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V \otimes V_k, W \otimes W_k) \xrightarrow{\psi'} \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1 \otimes \cdots \otimes V_k, W_1 \otimes \cdots \otimes W_k)$ .

Facilmente verifica-se que  $\tilde{\varphi} = \psi' \circ \tilde{\varphi}' \circ (\tilde{\varphi}_{k-1} \otimes \text{Id}) \circ \psi$ .

Como  $\psi'$ ,  $\tilde{\varphi}'$  e  $\psi$  são injetoras

# Núcleo e Imagem

A associatividade de  $\otimes$  induz os seguintes isomorfismos:

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, W_1) \otimes \cdots \otimes \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_k, W_k) &\xrightarrow{\psi} \\ (\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, W_1) \otimes \cdots \otimes \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_{k-1}, W_{k-1})) \otimes \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_k, W_k), \\ T_1 \otimes \cdots \otimes T_k &\mapsto (T_1 \otimes \cdots \otimes T_{k-1}) \otimes T_k, \end{aligned}$$

e  $\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V \otimes V_k, W \otimes W_k) \xrightarrow{\psi'} \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1 \otimes \cdots \otimes V_k, W_1 \otimes \cdots \otimes W_k)$ .

Facilmente verifica-se que  $\tilde{\varphi} = \psi' \circ \tilde{\varphi}' \circ (\tilde{\varphi}_{k-1} \otimes \text{Id}) \circ \psi$ .

Como  $\psi'$ ,  $\tilde{\varphi}'$  e  $\psi$  são injetoras, basta mostrar que  $\tilde{\varphi}_{k-1} \otimes \text{Id}$  também é.

# Núcleo e Imagem

A associatividade de  $\otimes$  induz os seguintes isomorfismos:

$$\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, W_1) \otimes \cdots \otimes \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_k, W_k) \xrightarrow{\psi}$$

$$(\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, W_1) \otimes \cdots \otimes \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_{k-1}, W_{k-1})) \otimes \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_k, W_k),$$

$$T_1 \otimes \cdots \otimes T_k \mapsto (T_1 \otimes \cdots \otimes T_{k-1}) \otimes T_k,$$

$$\text{e } \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V \otimes V_k, W \otimes W_k) \xrightarrow{\psi'} \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1 \otimes \cdots \otimes V_k, W_1 \otimes \cdots \otimes W_k).$$

Facilmente verifica-se que  $\tilde{\varphi} = \psi' \circ \tilde{\varphi}' \circ (\tilde{\varphi}_{k-1} \otimes \text{Id}) \circ \psi$ .

Como  $\psi'$ ,  $\tilde{\varphi}'$  e  $\psi$  são injetoras, basta mostrar que  $\tilde{\varphi}_{k-1} \otimes \text{Id}$  também é.

Isso é imediato do lema a seguir. □



# Núcleo e Imagem

A associatividade de  $\otimes$  induz os seguintes isomorfismos:

$$\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, W_1) \otimes \cdots \otimes \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_k, W_k) \xrightarrow{\psi} (\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, W_1) \otimes \cdots \otimes \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_{k-1}, W_{k-1})) \otimes \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_k, W_k),$$
$$T_1 \otimes \cdots \otimes T_k \mapsto (T_1 \otimes \cdots \otimes T_{k-1}) \otimes T_k,$$

e  $\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V \otimes V_k, W \otimes W_k) \xrightarrow{\psi'} \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1 \otimes \cdots \otimes V_k, W_1 \otimes \cdots \otimes W_k)$ .

Facilmente verifica-se que  $\tilde{\varphi} = \psi' \circ \tilde{\varphi}' \circ (\tilde{\varphi}_{k-1} \otimes \text{Id}) \circ \psi$ .

Como  $\psi'$ ,  $\tilde{\varphi}'$  e  $\psi$  são injetoras, basta mostrar que  $\tilde{\varphi}_{k-1} \otimes \text{Id}$  também é.

Isso é imediato do lema a seguir. □

## Lema 10.3.1

$$\text{a) } \text{Im}(T_1 \otimes \cdots \otimes T_k) = \text{Im}(T_1) \otimes \cdots \otimes \text{Im}(T_k).$$

# Núcleo e Imagem

A associatividade de  $\otimes$  induz os seguintes isomorfismos:

$$\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, W_1) \otimes \cdots \otimes \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_k, W_k) \xrightarrow{\psi} \\ (\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, W_1) \otimes \cdots \otimes \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_{k-1}, W_{k-1})) \otimes \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_k, W_k), \\ T_1 \otimes \cdots \otimes T_k \mapsto (T_1 \otimes \cdots \otimes T_{k-1}) \otimes T_k,$$

e  $\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V \otimes V_k, W \otimes W_k) \xrightarrow{\psi'} \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1 \otimes \cdots \otimes V_k, W_1 \otimes \cdots \otimes W_k)$ .

Facilmente verifica-se que  $\tilde{\varphi} = \psi' \circ \tilde{\varphi}' \circ (\tilde{\varphi}_{k-1} \otimes \text{Id}) \circ \psi$ .

Como  $\psi'$ ,  $\tilde{\varphi}'$  e  $\psi$  são injetoras, basta mostrar que  $\tilde{\varphi}_{k-1} \otimes \text{Id}$  também é.

Isso é imediato do lema a seguir. □

## Lema 10.3.1

- a**  $\text{Im}(T_1 \otimes \cdots \otimes T_k) = \text{Im}(T_1) \otimes \cdots \otimes \text{Im}(T_k)$ .
- b** Seja  $N_j = V_1 \otimes \cdots \otimes V_{j-1} \otimes \mathcal{N}(T_j) \otimes V_{j+1} \otimes \cdots \otimes V_k$ ,  $1 \leq j \leq k$ .

# Núcleo e Imagem

A associatividade de  $\otimes$  induz os seguintes isomorfismos:

$$\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, W_1) \otimes \cdots \otimes \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_k, W_k) \xrightarrow{\psi} \\ (\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, W_1) \otimes \cdots \otimes \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_{k-1}, W_{k-1})) \otimes \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_k, W_k), \\ T_1 \otimes \cdots \otimes T_k \mapsto (T_1 \otimes \cdots \otimes T_{k-1}) \otimes T_k,$$

e  $\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V \otimes V_k, W \otimes W_k) \xrightarrow{\psi'} \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1 \otimes \cdots \otimes V_k, W_1 \otimes \cdots \otimes W_k)$ .

Facilmente verifica-se que  $\tilde{\varphi} = \psi' \circ \tilde{\varphi}' \circ (\tilde{\varphi}_{k-1} \otimes \text{Id}) \circ \psi$ .

Como  $\psi'$ ,  $\tilde{\varphi}'$  e  $\psi$  são injetoras, basta mostrar que  $\tilde{\varphi}_{k-1} \otimes \text{Id}$  também é.

Isso é imediato do lema a seguir. □

## Lema 10.3.1

- a**  $\text{Im}(T_1 \otimes \cdots \otimes T_k) = \text{Im}(T_1) \otimes \cdots \otimes \text{Im}(T_k)$ .
- b** Seja  $N_j = V_1 \otimes \cdots \otimes V_{j-1} \otimes \mathcal{N}(T_j) \otimes V_{j+1} \otimes \cdots \otimes V_k$ ,  $1 \leq j \leq k$ .  
Então  $\mathcal{N}(T_1 \otimes \cdots \otimes T_k) = N_1 + \cdots + N_k$ .

# Núcleo e Imagem

A associatividade de  $\otimes$  induz os seguintes isomorfismos:

$$\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, W_1) \otimes \cdots \otimes \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_k, W_k) \xrightarrow{\psi} \\ (\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, W_1) \otimes \cdots \otimes \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_{k-1}, W_{k-1})) \otimes \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_k, W_k), \\ T_1 \otimes \cdots \otimes T_k \mapsto (T_1 \otimes \cdots \otimes T_{k-1}) \otimes T_k,$$

$$\text{e } \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V \otimes V_k, W \otimes W_k) \xrightarrow{\psi'} \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1 \otimes \cdots \otimes V_k, W_1 \otimes \cdots \otimes W_k).$$

Facilmente verifica-se que  $\tilde{\varphi} = \psi' \circ \tilde{\varphi}' \circ (\tilde{\varphi}_{k-1} \otimes \text{Id}) \circ \psi$ .

Como  $\psi'$ ,  $\tilde{\varphi}'$  e  $\psi$  são injetoras, basta mostrar que  $\tilde{\varphi}_{k-1} \otimes \text{Id}$  também é.

Isso é imediato do lema a seguir. □

## Lema 10.3.1

- a**  $\text{Im}(T_1 \otimes \cdots \otimes T_k) = \text{Im}(T_1) \otimes \cdots \otimes \text{Im}(T_k)$ .
- b** Seja  $N_j = V_1 \otimes \cdots \otimes V_{j-1} \otimes \mathcal{N}(T_j) \otimes V_{j+1} \otimes \cdots \otimes V_k$ ,  $1 \leq j \leq k$ .  
Então  $\mathcal{N}(T_1 \otimes \cdots \otimes T_k) = N_1 + \cdots + N_k$ . Em particular,  
 $T_1 \otimes \cdots \otimes T_k$  é injetora se  $T_j$  o for para todo  $1 \leq j \leq k$ .

# Núcleo e Imagem

A associatividade de  $\otimes$  induz os seguintes isomorfismos:

$$\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, W_1) \otimes \cdots \otimes \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_k, W_k) \xrightarrow{\psi} \\ (\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, W_1) \otimes \cdots \otimes \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_{k-1}, W_{k-1})) \otimes \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_k, W_k), \\ T_1 \otimes \cdots \otimes T_k \mapsto (T_1 \otimes \cdots \otimes T_{k-1}) \otimes T_k,$$

$$\text{e } \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V \otimes V_k, W \otimes W_k) \xrightarrow{\psi'} \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1 \otimes \cdots \otimes V_k, W_1 \otimes \cdots \otimes W_k).$$

Facilmente verifica-se que  $\tilde{\varphi} = \psi' \circ \tilde{\varphi}' \circ (\tilde{\varphi}_{k-1} \otimes \text{Id}) \circ \psi$ .

Como  $\psi'$ ,  $\tilde{\varphi}'$  e  $\psi$  são injetoras, basta mostrar que  $\tilde{\varphi}_{k-1} \otimes \text{Id}$  também é.

Isso é imediato do lema a seguir. □

## Lema 10.3.1

- a**  $\text{Im}(T_1 \otimes \cdots \otimes T_k) = \text{Im}(T_1) \otimes \cdots \otimes \text{Im}(T_k)$ .
- b** Seja  $N_j = V_1 \otimes \cdots \otimes V_{j-1} \otimes \mathcal{N}(T_j) \otimes V_{j+1} \otimes \cdots \otimes V_k$ ,  $1 \leq j \leq k$ .  
Então  $\mathcal{N}(T_1 \otimes \cdots \otimes T_k) = N_1 + \cdots + N_k$ . Em particular,  
 $T_1 \otimes \cdots \otimes T_k$  é injetora se  $T_j$  o for para todo  $1 \leq j \leq k$ .

**Dem.:** Parte (a) fica de exercício (fácil).

# Núcleo e Imagem

A associatividade de  $\otimes$  induz os seguintes isomorfismos:

$$\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, W_1) \otimes \cdots \otimes \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_k, W_k) \xrightarrow{\psi} \\ (\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, W_1) \otimes \cdots \otimes \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_{k-1}, W_{k-1})) \otimes \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_k, W_k), \\ T_1 \otimes \cdots \otimes T_k \mapsto (T_1 \otimes \cdots \otimes T_{k-1}) \otimes T_k,$$

$$\text{e } \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V \otimes V_k, W \otimes W_k) \xrightarrow{\psi'} \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1 \otimes \cdots \otimes V_k, W_1 \otimes \cdots \otimes W_k).$$

Facilmente verifica-se que  $\tilde{\varphi} = \psi' \circ \tilde{\varphi}' \circ (\tilde{\varphi}_{k-1} \otimes \text{Id}) \circ \psi$ .

Como  $\psi'$ ,  $\tilde{\varphi}'$  e  $\psi$  são injetoras, basta mostrar que  $\tilde{\varphi}_{k-1} \otimes \text{Id}$  também é.

Isso é imediato do lema a seguir. □

## Lema 10.3.1

- a**  $\text{Im}(T_1 \otimes \cdots \otimes T_k) = \text{Im}(T_1) \otimes \cdots \otimes \text{Im}(T_k)$ .
- b** Seja  $N_j = V_1 \otimes \cdots \otimes V_{j-1} \otimes \mathcal{N}(T_j) \otimes V_{j+1} \otimes \cdots \otimes V_k$ ,  $1 \leq j \leq k$ .  
Então  $\mathcal{N}(T_1 \otimes \cdots \otimes T_k) = N_1 + \cdots + N_k$ . Em particular,  
 $T_1 \otimes \cdots \otimes T_k$  é injetora se  $T_j$  o for para todo  $1 \leq j \leq k$ .

**Dem.:** Parte (a) fica de exercício (fácil). A segunda afirmação de (b) é imediata da primeira pois  $N_j = \{0\} \forall j$ .

A continência  $N_j \subseteq \mathcal{N}(T_1 \otimes \cdots \otimes T_k)$  é óbvia

A continência  $N_j \subseteq \mathcal{N}(T_1 \otimes \cdots \otimes T_k)$  é óbvia e, portanto, se  $N := N_1 + \cdots + N_k$ , temos  $N \subseteq \mathcal{N}(T_1 \otimes \cdots \otimes T_k)$ .



A continência  $N_j \subseteq \mathcal{N}(T_1 \otimes \cdots \otimes T_k)$  é óbvia e, portanto, se  $N := N_1 + \cdots + N_k$ , temos  $N \subseteq \mathcal{N}(T_1 \otimes \cdots \otimes T_k)$ . Sejam

$$V = V_1 \otimes \cdots \otimes V_k \quad \text{e} \quad W = \text{Im}(T_1) \otimes \cdots \otimes \text{Im}(T_k) = \text{Im}(T_1 \otimes \cdots \otimes T_k).$$

A continência  $N_j \subseteq \mathcal{N}(T_1 \otimes \cdots \otimes T_k)$  é óbvia e, portanto, se  $N := N_1 + \cdots + N_k$ , temos  $N \subseteq \mathcal{N}(T_1 \otimes \cdots \otimes T_k)$ . Sejam

$$V = V_1 \otimes \cdots \otimes V_k \quad \text{e} \quad W = \text{Im}(T_1) \otimes \cdots \otimes \text{Im}(T_k) = \text{Im}(T_1 \otimes \cdots \otimes T_k).$$

Considere a projeção canônica  $\pi : V \rightarrow V/N$ . Mostraremos que existe  $S \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(W, V/N)$  tal que

$$(2) \quad S \circ (T_1 \otimes \cdots \otimes T_k) = \pi.$$

A continência  $N_j \subseteq \mathcal{N}(T_1 \otimes \cdots \otimes T_k)$  é óbvia e, portanto, se  $N := N_1 + \cdots + N_k$ , temos  $N \subseteq \mathcal{N}(T_1 \otimes \cdots \otimes T_k)$ . Sejam

$$V = V_1 \otimes \cdots \otimes V_k \quad \text{e} \quad W = \text{Im}(T_1) \otimes \cdots \otimes \text{Im}(T_k) = \text{Im}(T_1 \otimes \cdots \otimes T_k).$$

Considere a projeção canônica  $\pi : V \rightarrow V/N$ . Mostraremos que existe  $S \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(W, V/N)$  tal que

$$(2) \quad S \circ (T_1 \otimes \cdots \otimes T_k) = \pi.$$

Assim,  $\mathcal{N}(T_1 \otimes \cdots \otimes T_k) \subseteq \mathcal{N}(S \circ (T_1 \otimes \cdots \otimes T_k))$

A continência  $N_j \subseteq \mathcal{N}(T_1 \otimes \cdots \otimes T_k)$  é óbvia e, portanto, se  $N := N_1 + \cdots + N_k$ , temos  $N \subseteq \mathcal{N}(T_1 \otimes \cdots \otimes T_k)$ . Sejam

$$V = V_1 \otimes \cdots \otimes V_k \quad \text{e} \quad W = \text{Im}(T_1) \otimes \cdots \otimes \text{Im}(T_k) = \text{Im}(T_1 \otimes \cdots \otimes T_k).$$

Considere a projeção canônica  $\pi : V \rightarrow V/N$ . Mostraremos que existe  $S \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(W, V/N)$  tal que

$$(2) \quad S \circ (T_1 \otimes \cdots \otimes T_k) = \pi.$$

Assim,  $\mathcal{N}(T_1 \otimes \cdots \otimes T_k) \subseteq \mathcal{N}(S \circ (T_1 \otimes \cdots \otimes T_k)) \stackrel{(2)}{=} N$

A continência  $N_j \subseteq \mathcal{N}(T_1 \otimes \cdots \otimes T_k)$  é óbvia e, portanto, se  $N := N_1 + \cdots + N_k$ , temos  $N \subseteq \mathcal{N}(T_1 \otimes \cdots \otimes T_k)$ . Sejam

$$V = V_1 \otimes \cdots \otimes V_k \quad \text{e} \quad W = \text{Im}(T_1) \otimes \cdots \otimes \text{Im}(T_k) = \text{Im}(T_1 \otimes \cdots \otimes T_k).$$

Considere a projeção canônica  $\pi : V \rightarrow V/N$ . Mostraremos que existe  $S \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(W, V/N)$  tal que

$$(2) \quad S \circ (T_1 \otimes \cdots \otimes T_k) = \pi.$$

Assim,  $\mathcal{N}(T_1 \otimes \cdots \otimes T_k) \subseteq \mathcal{N}(S \circ (T_1 \otimes \cdots \otimes T_k)) \stackrel{(2)}{=} N$ , e o lema segue.

A continência  $N_j \subseteq \mathcal{N}(T_1 \otimes \cdots \otimes T_k)$  é óbvia e, portanto, se  $N := N_1 + \cdots + N_k$ , temos  $N \subseteq \mathcal{N}(T_1 \otimes \cdots \otimes T_k)$ . Sejam

$$V = V_1 \otimes \cdots \otimes V_k \quad \text{e} \quad W = \text{Im}(T_1) \otimes \cdots \otimes \text{Im}(T_k) = \text{Im}(T_1 \otimes \cdots \otimes T_k).$$

Considere a projeção canônica  $\pi : V \rightarrow V/N$ . Mostraremos que existe  $S \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(W, V/N)$  tal que

$$(2) \quad S \circ (T_1 \otimes \cdots \otimes T_k) = \pi.$$

Assim,  $\mathcal{N}(T_1 \otimes \cdots \otimes T_k) \subseteq \mathcal{N}(S \circ (T_1 \otimes \cdots \otimes T_k)) \stackrel{(2)}{=} N$ , e o lema segue.

Veamos então como definir  $S$  satisfazendo (2). Para cada  $1 \leq j \leq k$ , seja  $\sigma_j$  uma inversa à direita para  $T_j$

A continência  $N_j \subseteq \mathcal{N}(T_1 \otimes \cdots \otimes T_k)$  é óbvia e, portanto, se  $N := N_1 + \cdots + N_k$ , temos  $N \subseteq \mathcal{N}(T_1 \otimes \cdots \otimes T_k)$ . Sejam

$$V = V_1 \otimes \cdots \otimes V_k \quad \text{e} \quad W = \text{Im}(T_1) \otimes \cdots \otimes \text{Im}(T_k) = \text{Im}(T_1 \otimes \cdots \otimes T_k).$$

Considere a projeção canônica  $\pi : V \rightarrow V/N$ . Mostraremos que existe  $S \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(W, V/N)$  tal que

$$(2) \quad S \circ (T_1 \otimes \cdots \otimes T_k) = \pi.$$

Assim,  $\mathcal{N}(T_1 \otimes \cdots \otimes T_k) \subseteq \mathcal{N}(S \circ (T_1 \otimes \cdots \otimes T_k)) \stackrel{(2)}{=} N$ , e o lema segue.

Veamos então como definir  $S$  satisfazendo (2). Para cada  $1 \leq j \leq k$ , seja  $\sigma_j$  uma inversa à direita para  $T_j$ , i.e.,  $\sigma_j : \text{Im}(T_j) \rightarrow V_j$  satisfaz

$$T_j(\sigma_j(w)) = w \quad \forall w \in \text{Im}(T_j).$$

A continência  $N_j \subseteq \mathcal{N}(T_1 \otimes \cdots \otimes T_k)$  é óbvia e, portanto, se  $N := N_1 + \cdots + N_k$ , temos  $N \subseteq \mathcal{N}(T_1 \otimes \cdots \otimes T_k)$ . Sejam

$$V = V_1 \otimes \cdots \otimes V_k \quad \text{e} \quad W = \text{Im}(T_1) \otimes \cdots \otimes \text{Im}(T_k) = \text{Im}(T_1 \otimes \cdots \otimes T_k).$$

Considere a projeção canônica  $\pi : V \rightarrow V/N$ . Mostraremos que existe  $S \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(W, V/N)$  tal que

$$(2) \quad S \circ (T_1 \otimes \cdots \otimes T_k) = \pi.$$

Assim,  $\mathcal{N}(T_1 \otimes \cdots \otimes T_k) \subseteq \mathcal{N}(S \circ (T_1 \otimes \cdots \otimes T_k)) \stackrel{(2)}{=} N$ , e o lema segue.

Veamos então como definir  $S$  satisfazendo (2). Para cada  $1 \leq j \leq k$ , seja  $\sigma_j$  uma inversa à direita para  $T_j$ , i.e.,  $\sigma_j : \text{Im}(T_j) \rightarrow V_j$  satisfaz

$$T_j(\sigma_j(w)) = w \quad \forall w \in \text{Im}(T_j).$$

Isso implica que

$$(3) \quad \sigma_j(T_j(v)) - v \in \mathcal{N}(T_j) \quad \forall v \in V_j.$$



A continência  $N_j \subseteq \mathcal{N}(T_1 \otimes \cdots \otimes T_k)$  é óbvia e, portanto, se  $N := N_1 + \cdots + N_k$ , temos  $N \subseteq \mathcal{N}(T_1 \otimes \cdots \otimes T_k)$ . Sejam

$$V = V_1 \otimes \cdots \otimes V_k \quad \text{e} \quad W = \text{Im}(T_1) \otimes \cdots \otimes \text{Im}(T_k) = \text{Im}(T_1 \otimes \cdots \otimes T_k).$$

Considere a projeção canônica  $\pi : V \rightarrow V/N$ . Mostraremos que existe  $S \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(W, V/N)$  tal que

$$(2) \quad S \circ (T_1 \otimes \cdots \otimes T_k) = \pi.$$

Assim,  $\mathcal{N}(T_1 \otimes \cdots \otimes T_k) \subseteq \mathcal{N}(S \circ (T_1 \otimes \cdots \otimes T_k)) \stackrel{(2)}{=} N$ , e o lema segue.

Vejamos então como definir  $S$  satisfazendo (2). Para cada  $1 \leq j \leq k$ , seja  $\sigma_j$  uma inversa à direita para  $T_j$ , i.e.,  $\sigma_j : \text{Im}(T_j) \rightarrow V_j$  satisfaz

$$T_j(\sigma_j(w)) = w \quad \forall w \in \text{Im}(T_j).$$

Isso implica que

$$(3) \quad \sigma_j(T_j(v)) - v \in \mathcal{N}(T_j) \quad \forall v \in V_j.$$

De fato,  $T_j(\sigma_j(T_j(v)) - v) = T_j(\sigma_j(T_j(v))) - T_j(v) = 0$ .

A continência  $N_j \subseteq \mathcal{N}(T_1 \otimes \cdots \otimes T_k)$  é óbvia e, portanto, se  $N := N_1 + \cdots + N_k$ , temos  $N \subseteq \mathcal{N}(T_1 \otimes \cdots \otimes T_k)$ . Sejam

$$V = V_1 \otimes \cdots \otimes V_k \quad \text{e} \quad W = \text{Im}(T_1) \otimes \cdots \otimes \text{Im}(T_k) = \text{Im}(T_1 \otimes \cdots \otimes T_k).$$

Considere a projeção canônica  $\pi : V \rightarrow V/N$ . Mostraremos que existe  $S \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(W, V/N)$  tal que

$$(2) \quad S \circ (T_1 \otimes \cdots \otimes T_k) = \pi.$$

Assim,  $\mathcal{N}(T_1 \otimes \cdots \otimes T_k) \subseteq \mathcal{N}(S \circ (T_1 \otimes \cdots \otimes T_k)) \stackrel{(2)}{=} N$ , e o lema segue.

Vejamos então como definir  $S$  satisfazendo (2). Para cada  $1 \leq j \leq k$ , seja  $\sigma_j$  uma inversa à direita para  $T_j$ , i.e.,  $\sigma_j : \text{Im}(T_j) \rightarrow V_j$  satisfaz

$$T_j(\sigma_j(w)) = w \quad \forall w \in \text{Im}(T_j).$$

Isso implica que

$$(3) \quad \sigma_j(T_j(v)) - v \in \mathcal{N}(T_j) \quad \forall v \in V_j.$$

De fato,  $T_j(\sigma_j(T_j(v)) - v) = T_j(\sigma_j(T_j(v))) - T_j(v) = 0$ . Defina

$$\sigma : \text{Im}(T_1) \times \cdots \times \text{Im}(T_k) \rightarrow V/N$$

A continência  $N_j \subseteq \mathcal{N}(T_1 \otimes \cdots \otimes T_k)$  é óbvia e, portanto, se  $N := N_1 + \cdots + N_k$ , temos  $N \subseteq \mathcal{N}(T_1 \otimes \cdots \otimes T_k)$ . Sejam

$$V = V_1 \otimes \cdots \otimes V_k \quad \text{e} \quad W = \text{Im}(T_1) \otimes \cdots \otimes \text{Im}(T_k) = \text{Im}(T_1 \otimes \cdots \otimes T_k).$$

Considere a projeção canônica  $\pi : V \rightarrow V/N$ . Mostraremos que existe  $S \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(W, V/N)$  tal que

$$(2) \quad S \circ (T_1 \otimes \cdots \otimes T_k) = \pi.$$

Assim,  $\mathcal{N}(T_1 \otimes \cdots \otimes T_k) \subseteq \mathcal{N}(S \circ (T_1 \otimes \cdots \otimes T_k)) \stackrel{(2)}{=} N$ , e o lema segue.

Veamos então como definir  $S$  satisfazendo (2). Para cada  $1 \leq j \leq k$ , seja  $\sigma_j$  uma inversa à direita para  $T_j$ , i.e.,  $\sigma_j : \text{Im}(T_j) \rightarrow V_j$  satisfaz

$$T_j(\sigma_j(w)) = w \quad \forall w \in \text{Im}(T_j).$$

Isso implica que

$$(3) \quad \sigma_j(T_j(v)) - v \in \mathcal{N}(T_j) \quad \forall v \in V_j.$$

De fato,  $T_j(\sigma_j(T_j(v)) - v) = T_j(\sigma_j(T_j(v))) - T_j(v) = 0$ . Defina

$$\sigma : \text{Im}(T_1) \times \cdots \times \text{Im}(T_k) \rightarrow V/N, (w_1, \dots, w_k) \mapsto \pi(\sigma_1(w_1) \otimes \cdots \otimes \sigma_k(w_k)).$$

A continência  $N_j \subseteq \mathcal{N}(T_1 \otimes \cdots \otimes T_k)$  é óbvia e, portanto, se  $N := N_1 + \cdots + N_k$ , temos  $N \subseteq \mathcal{N}(T_1 \otimes \cdots \otimes T_k)$ . Sejam

$$V = V_1 \otimes \cdots \otimes V_k \quad \text{e} \quad W = \text{Im}(T_1) \otimes \cdots \otimes \text{Im}(T_k) = \text{Im}(T_1 \otimes \cdots \otimes T_k).$$

Considere a projeção canônica  $\pi : V \rightarrow V/N$ . Mostraremos que existe  $S \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(W, V/N)$  tal que

$$(2) \quad S \circ (T_1 \otimes \cdots \otimes T_k) = \pi.$$

Assim,  $\mathcal{N}(T_1 \otimes \cdots \otimes T_k) \subseteq \mathcal{N}(S \circ (T_1 \otimes \cdots \otimes T_k)) \stackrel{(2)}{=} N$ , e o lema segue.

Vejamos então como definir  $S$  satisfazendo (2). Para cada  $1 \leq j \leq k$ , seja  $\sigma_j$  uma inversa à direita para  $T_j$ , i.e.,  $\sigma_j : \text{Im}(T_j) \rightarrow V_j$  satisfaz

$$T_j(\sigma_j(w)) = w \quad \forall w \in \text{Im}(T_j).$$

Isso implica que

$$(3) \quad \sigma_j(T_j(v)) - v \in \mathcal{N}(T_j) \quad \forall v \in V_j.$$

De fato,  $T_j(\sigma_j(T_j(v)) - v) = T_j(\sigma_j(T_j(v))) - T_j(v) = 0$ . Defina

$$\sigma : \text{Im}(T_1) \times \cdots \times \text{Im}(T_k) \rightarrow V/N, (w_1, \dots, w_k) \mapsto \pi(\sigma_1(w_1) \otimes \cdots \otimes \sigma_k(w_k)).$$

Mostraremos que  $\sigma$  é  $k$ -linear

A continência  $N_j \subseteq \mathcal{N}(T_1 \otimes \cdots \otimes T_k)$  é óbvia e, portanto, se  $N := N_1 + \cdots + N_k$ , temos  $N \subseteq \mathcal{N}(T_1 \otimes \cdots \otimes T_k)$ . Sejam

$$V = V_1 \otimes \cdots \otimes V_k \quad \text{e} \quad W = \text{Im}(T_1) \otimes \cdots \otimes \text{Im}(T_k) = \text{Im}(T_1 \otimes \cdots \otimes T_k).$$

Considere a projeção canônica  $\pi : V \rightarrow V/N$ . Mostraremos que existe  $S \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(W, V/N)$  tal que

$$(2) \quad S \circ (T_1 \otimes \cdots \otimes T_k) = \pi.$$

Assim,  $\mathcal{N}(T_1 \otimes \cdots \otimes T_k) \subseteq \mathcal{N}(S \circ (T_1 \otimes \cdots \otimes T_k)) \stackrel{(2)}{=} N$ , e o lema segue.

Veamos então como definir  $S$  satisfazendo (2). Para cada  $1 \leq j \leq k$ , seja  $\sigma_j$  uma inversa à direita para  $T_j$ , i.e.,  $\sigma_j : \text{Im}(T_j) \rightarrow V_j$  satisfaz

$$T_j(\sigma_j(w)) = w \quad \forall w \in \text{Im}(T_j).$$

Isso implica que

$$(3) \quad \sigma_j(T_j(v)) - v \in \mathcal{N}(T_j) \quad \forall v \in V_j.$$

De fato,  $T_j(\sigma_j(T_j(v)) - v) = T_j(\sigma_j(T_j(v))) - T_j(v) = 0$ . Defina

$$\sigma : \text{Im}(T_1) \times \cdots \times \text{Im}(T_k) \rightarrow V/N, (w_1, \dots, w_k) \mapsto \pi(\sigma_1(w_1) \otimes \cdots \otimes \sigma_k(w_k)).$$

Mostraremos que  $\sigma$  é  $k$ -linear e que  $S := \tilde{\sigma}$  satisfaz (2).

Mostremos que  $\tilde{\sigma}$  satisfaz (2).

Mostremos que  $\tilde{\sigma}$  satisfaz (2). Dados  $v_j \in V_j, 1 \leq j \leq k$ , (3) nos diz que existe  $v'_j \in \mathcal{N}(T_j)$  tal que  $\sigma_j(T_j(v_j)) = v_j + v'_j$ .

Mostremos que  $\tilde{\sigma}$  satisfaz (2). Dados  $v_j \in V_j, 1 \leq j \leq k$ , (3) nos diz que existe  $v'_j \in \mathcal{N}(T_j)$  tal que  $\sigma_j(T_j(v_j)) = v_j + v'_j$ . Então,

$$S((T_1 \otimes \cdots \otimes T_k)(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k))$$



Mostremos que  $\tilde{\sigma}$  satisfaz (2). Dados  $v_j \in V_j, 1 \leq j \leq k$ , (3) nos diz que existe  $v'_j \in \mathcal{N}(T_j)$  tal que  $\sigma_j(T_j(v_j)) = v_j + v'_j$ . Então,

$$S((T_1 \otimes \cdots \otimes T_k)(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k)) = S(T_1(v_1) \otimes \cdots \otimes T_k(v_k))$$

Mostremos que  $\tilde{\sigma}$  satisfaz (2). Dados  $v_j \in V_j, 1 \leq j \leq k$ , (3) nos diz que existe  $v'_j \in \mathcal{N}(T_j)$  tal que  $\sigma_j(T_j(v_j)) = v_j + v'_j$ . Então,

$$\begin{aligned} S((T_1 \otimes \cdots \otimes T_k)(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k)) &= S(T_1(v_1) \otimes \cdots \otimes T_k(v_k)) \\ &= \sigma(T_1(v_1), \dots, T_k(v_k)) \end{aligned}$$

Mostremos que  $\tilde{\sigma}$  satisfaz (2). Dados  $v_j \in V_j, 1 \leq j \leq k$ , (3) nos diz que existe  $v'_j \in \mathcal{N}(T_j)$  tal que  $\sigma_j(T_j(v_j)) = v_j + v'_j$ . Então,

$$\begin{aligned} S((T_1 \otimes \cdots \otimes T_k)(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k)) &= S(T_1(v_1) \otimes \cdots \otimes T_k(v_k)) \\ &= \sigma(T_1(v_1), \dots, T_k(v_k)) = \pi(\sigma_1(T_1(v_1)) \otimes \cdots \otimes \sigma_k(T_k(v_k))) \end{aligned}$$

Mostremos que  $\tilde{\sigma}$  satisfaz (2). Dados  $v_j \in V_j, 1 \leq j \leq k$ , (3) nos diz que existe  $v'_j \in \mathcal{N}(T_j)$  tal que  $\sigma_j(T_j(v_j)) = v_j + v'_j$ . Então,

$$\begin{aligned} S((T_1 \otimes \cdots \otimes T_k)(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k)) &= S(T_1(v_1) \otimes \cdots \otimes T_k(v_k)) \\ &= \sigma(T_1(v_1), \dots, T_k(v_k)) = \pi(\sigma_1(T_1(v_1)) \otimes \cdots \otimes \sigma_k(T_k(v_k))) \\ &= \pi((v_1 + v'_1) \otimes \cdots \otimes (v_k + v'_k)) \end{aligned}$$

Mostremos que  $\tilde{\sigma}$  satisfaz (2). Dados  $v_j \in V_j, 1 \leq j \leq k$ , (3) nos diz que existe  $v'_j \in \mathcal{N}(T_j)$  tal que  $\sigma_j(T_j(v_j)) = v_j + v'_j$ . Então,

$$\begin{aligned} S((T_1 \otimes \cdots \otimes T_k)(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k)) &= S(T_1(v_1) \otimes \cdots \otimes T_k(v_k)) \\ &= \sigma(T_1(v_1), \dots, T_k(v_k)) = \pi(\sigma_1(T_1(v_1)) \otimes \cdots \otimes \sigma_k(T_k(v_k))) \\ &= \pi((v_1 + v'_1) \otimes \cdots \otimes (v_k + v'_k)) = \pi(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k) + \pi(\mathbf{v}) \end{aligned}$$

Mostremos que  $\tilde{\sigma}$  satisfaz (2). Dados  $v_j \in V_j, 1 \leq j \leq k$ , (3) nos diz que existe  $v'_j \in \mathcal{N}(T_j)$  tal que  $\sigma_j(T_j(v_j)) = v_j + v'_j$ . Então,

$$\begin{aligned} S((T_1 \otimes \cdots \otimes T_k)(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k)) &= S(T_1(v_1) \otimes \cdots \otimes T_k(v_k)) \\ &= \sigma(T_1(v_1), \dots, T_k(v_k)) = \pi(\sigma_1(T_1(v_1)) \otimes \cdots \otimes \sigma_k(T_k(v_k))) \\ &= \pi((v_1 + v'_1) \otimes \cdots \otimes (v_k + v'_k)) = \pi(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k) + \pi(\mathbf{v}) \end{aligned}$$

onde  $\mathbf{v}$  é uma soma de elementos em  $N$ .

Mostremos que  $\tilde{\sigma}$  satisfaz (2). Dados  $v_j \in V_j, 1 \leq j \leq k$ , (3) nos diz que existe  $v'_j \in \mathcal{N}(T_j)$  tal que  $\sigma_j(T_j(v_j)) = v_j + v'_j$ . Então,

$$\begin{aligned} S((T_1 \otimes \cdots \otimes T_k)(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k)) &= S(T_1(v_1) \otimes \cdots \otimes T_k(v_k)) \\ &= \sigma(T_1(v_1), \dots, T_k(v_k)) = \pi(\sigma_1(T_1(v_1)) \otimes \cdots \otimes \sigma_k(T_k(v_k))) \\ &= \pi((v_1 + v'_1) \otimes \cdots \otimes (v_k + v'_k)) = \pi(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k) + \pi(\mathbf{v}) \end{aligned}$$

onde  $\mathbf{v}$  é uma soma de elementos em  $N$ . Isso mostra a validade de (2).

Mostremos que  $\tilde{\sigma}$  satisfaz (2). Dados  $v_j \in V_j, 1 \leq j \leq k$ , (3) nos diz que existe  $v'_j \in \mathcal{N}(T_j)$  tal que  $\sigma_j(T_j(v_j)) = v_j + v'_j$ . Então,

$$\begin{aligned} S((T_1 \otimes \cdots \otimes T_k)(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k)) &= S(T_1(v_1) \otimes \cdots \otimes T_k(v_k)) \\ &= \sigma(T_1(v_1), \dots, T_k(v_k)) = \pi(\sigma_1(T_1(v_1)) \otimes \cdots \otimes \sigma_k(T_k(v_k))) \\ &= \pi((v_1 + v'_1) \otimes \cdots \otimes (v_k + v'_k)) = \pi(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k) + \pi(\mathbf{v}) \end{aligned}$$

onde  $\mathbf{v}$  é uma soma de elementos em  $N$ . Isso mostra a validade de (2).

Mostremos a linearidade de  $\sigma$  na primeira entrada.



Mostremos que  $\tilde{\sigma}$  satisfaz (2). Dados  $v_j \in V_j, 1 \leq j \leq k$ , (3) nos diz que existe  $v'_j \in \mathcal{N}(T_j)$  tal que  $\sigma_j(T_j(v_j)) = v_j + v'_j$ . Então,

$$\begin{aligned} S((T_1 \otimes \cdots \otimes T_k)(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k)) &= S(T_1(v_1) \otimes \cdots \otimes T_k(v_k)) \\ &= \sigma(T_1(v_1), \dots, T_k(v_k)) = \pi(\sigma_1(T_1(v_1)) \otimes \cdots \otimes \sigma_k(T_k(v_k))) \\ &= \pi((v_1 + v'_1) \otimes \cdots \otimes (v_k + v'_k)) = \pi(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k) + \pi(\mathbf{v}) \end{aligned}$$

onde  $\mathbf{v}$  é uma soma de elementos em  $N$ . Isso mostra a validade de (2).

Mostremos a linearidade de  $\sigma$  na primeira entrada. Dados  $w_j \in \text{Im}(T_j), 1 \leq j \leq k$

Mostremos que  $\tilde{\sigma}$  satisfaz (2). Dados  $v_j \in V_j, 1 \leq j \leq k$ , (3) nos diz que existe  $v'_j \in \mathcal{N}(T_j)$  tal que  $\sigma_j(T_j(v_j)) = v_j + v'_j$ . Então,

$$\begin{aligned} S((T_1 \otimes \cdots \otimes T_k)(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k)) &= S(T_1(v_1) \otimes \cdots \otimes T_k(v_k)) \\ &= \sigma(T_1(v_1), \dots, T_k(v_k)) = \pi(\sigma_1(T_1(v_1)) \otimes \cdots \otimes \sigma_k(T_k(v_k))) \\ &= \pi((v_1 + v'_1) \otimes \cdots \otimes (v_k + v'_k)) = \pi(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k) + \pi(\mathbf{v}) \end{aligned}$$

onde  $\mathbf{v}$  é uma soma de elementos em  $N$ . Isso mostra a validade de (2).

Mostremos a linearidade de  $\sigma$  na primeira entrada. Dados  $w_j \in Im(T_j), 1 \leq j \leq k, w'_1 \in Im(T_1)$

Mostremos que  $\tilde{\sigma}$  satisfaz (2). Dados  $v_j \in V_j, 1 \leq j \leq k$ , (3) nos diz que existe  $v'_j \in \mathcal{N}(T_j)$  tal que  $\sigma_j(T_j(v_j)) = v_j + v'_j$ . Então,

$$\begin{aligned} S((T_1 \otimes \cdots \otimes T_k)(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k)) &= S(T_1(v_1) \otimes \cdots \otimes T_k(v_k)) \\ &= \sigma(T_1(v_1), \dots, T_k(v_k)) = \pi(\sigma_1(T_1(v_1)) \otimes \cdots \otimes \sigma_k(T_k(v_k))) \\ &= \pi((v_1 + v'_1) \otimes \cdots \otimes (v_k + v'_k)) = \pi(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k) + \pi(\mathbf{v}) \end{aligned}$$

onde  $\mathbf{v}$  é uma soma de elementos em  $N$ . Isso mostra a validade de (2).

Mostremos a linearidade de  $\sigma$  na primeira entrada. Dados  $w_j \in Im(T_j), 1 \leq j \leq k, w'_1 \in Im(T_1)$  e  $\lambda \in \mathbb{F}$

Mostremos que  $\tilde{\sigma}$  satisfaz (2). Dados  $v_j \in V_j, 1 \leq j \leq k$ , (3) nos diz que existe  $v'_j \in \mathcal{N}(T_j)$  tal que  $\sigma_j(T_j(v_j)) = v_j + v'_j$ . Então,

$$\begin{aligned} S((T_1 \otimes \cdots \otimes T_k)(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k)) &= S(T_1(v_1) \otimes \cdots \otimes T_k(v_k)) \\ &= \sigma(T_1(v_1), \dots, T_k(v_k)) = \pi(\sigma_1(T_1(v_1)) \otimes \cdots \otimes \sigma_k(T_k(v_k))) \\ &= \pi((v_1 + v'_1) \otimes \cdots \otimes (v_k + v'_k)) = \pi(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k) + \pi(\mathbf{v}) \end{aligned}$$

onde  $\mathbf{v}$  é uma soma de elementos em  $N$ . Isso mostra a validade de (2).

Mostremos a linearidade de  $\sigma$  na primeira entrada. Dados  $w_j \in Im(T_j), 1 \leq j \leq k, w'_1 \in Im(T_1)$  e  $\lambda \in \mathbb{F}$ , note que, como

$$\begin{aligned} T_1(\sigma_1(w_1) + \lambda\sigma_1(w'_1) - \sigma_1(w_1 + \lambda w'_1)) \\ = T_1(\sigma_1(w_1)) + \lambda T_1(\sigma_1(w'_1)) - T_1(\sigma_1(w_1 + \lambda w'_1)) = 0, \end{aligned}$$

$\exists v \in \mathcal{N}(T_1)$  t.q.  $\sigma_1(w_1 + \lambda w'_1) = \sigma_1(w_1) + \lambda\sigma_1(w'_1) + v$ .

Mostremos que  $\tilde{\sigma}$  satisfaz (2). Dados  $v_j \in V_j, 1 \leq j \leq k$ , (3) nos diz que existe  $v'_j \in \mathcal{N}(T_j)$  tal que  $\sigma_j(T_j(v_j)) = v_j + v'_j$ . Então,

$$\begin{aligned} S((T_1 \otimes \cdots \otimes T_k)(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k)) &= S(T_1(v_1) \otimes \cdots \otimes T_k(v_k)) \\ &= \sigma(T_1(v_1), \dots, T_k(v_k)) = \pi(\sigma_1(T_1(v_1)) \otimes \cdots \otimes \sigma_k(T_k(v_k))) \\ &= \pi((v_1 + v'_1) \otimes \cdots \otimes (v_k + v'_k)) = \pi(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k) + \pi(\mathbf{v}) \end{aligned}$$

onde  $\mathbf{v}$  é uma soma de elementos em  $N$ . Isso mostra a validade de (2).

Mostremos a linearidade de  $\sigma$  na primeira entrada. Dados  $w_j \in Im(T_j), 1 \leq j \leq k, w'_1 \in Im(T_1)$  e  $\lambda \in \mathbb{F}$ , note que, como

$$\begin{aligned} T_1(\sigma_1(w_1) + \lambda\sigma_1(w'_1) - \sigma_1(w_1 + \lambda w'_1)) \\ = T_1(\sigma_1(w_1)) + \lambda T_1(\sigma_1(w'_1)) - T_1(\sigma_1(w_1 + \lambda w'_1)) = 0, \end{aligned}$$

$\exists v \in \mathcal{N}(T_1)$  t.q.  $\sigma_1(w_1 + \lambda w'_1) = \sigma_1(w_1) + \lambda\sigma_1(w'_1) + v$ . Assim,  
 $\sigma(w_1 + \lambda w'_1, w_2, \dots, w_k)$

Mostremos que  $\tilde{\sigma}$  satisfaz (2). Dados  $v_j \in V_j, 1 \leq j \leq k$ , (3) nos diz que existe  $v'_j \in \mathcal{N}(T_j)$  tal que  $\sigma_j(T_j(v_j)) = v_j + v'_j$ . Então,

$$\begin{aligned} S((T_1 \otimes \cdots \otimes T_k)(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k)) &= S(T_1(v_1) \otimes \cdots \otimes T_k(v_k)) \\ &= \sigma(T_1(v_1), \dots, T_k(v_k)) = \pi(\sigma_1(T_1(v_1)) \otimes \cdots \otimes \sigma_k(T_k(v_k))) \\ &= \pi((v_1 + v'_1) \otimes \cdots \otimes (v_k + v'_k)) = \pi(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k) + \pi(\mathbf{v}) \end{aligned}$$

onde  $\mathbf{v}$  é uma soma de elementos em  $N$ . Isso mostra a validade de (2).

Mostremos a linearidade de  $\sigma$  na primeira entrada. Dados  $w_j \in Im(T_j), 1 \leq j \leq k, w'_1 \in Im(T_1)$  e  $\lambda \in \mathbb{F}$ , note que, como

$$\begin{aligned} T_1(\sigma_1(w_1) + \lambda\sigma_1(w'_1) - \sigma_1(w_1 + \lambda w'_1)) \\ = T_1(\sigma_1(w_1)) + \lambda T_1(\sigma_1(w'_1)) - T_1(\sigma_1(w_1 + \lambda w'_1)) = 0, \end{aligned}$$

$\exists v \in \mathcal{N}(T_1)$  t.q.  $\sigma_1(w_1 + \lambda w'_1) = \sigma_1(w_1) + \lambda\sigma_1(w'_1) + v$ . Assim,

$$\sigma(w_1 + \lambda w'_1, w_2, \dots, w_k) = \pi(\sigma_1(w_1 + \lambda w'_1) \otimes \sigma_2(w_2) \otimes \cdots \otimes \sigma_k(w_k))$$

Mostremos que  $\tilde{\sigma}$  satisfaz (2). Dados  $v_j \in V_j, 1 \leq j \leq k$ , (3) nos diz que existe  $v'_j \in \mathcal{N}(T_j)$  tal que  $\sigma_j(T_j(v_j)) = v_j + v'_j$ . Então,

$$\begin{aligned} S((T_1 \otimes \cdots \otimes T_k)(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k)) &= S(T_1(v_1) \otimes \cdots \otimes T_k(v_k)) \\ &= \sigma(T_1(v_1), \dots, T_k(v_k)) = \pi(\sigma_1(T_1(v_1)) \otimes \cdots \otimes \sigma_k(T_k(v_k))) \\ &= \pi((v_1 + v'_1) \otimes \cdots \otimes (v_k + v'_k)) = \pi(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k) + \pi(\mathbf{v}) \end{aligned}$$

onde  $\mathbf{v}$  é uma soma de elementos em  $N$ . Isso mostra a validade de (2).

Mostremos a linearidade de  $\sigma$  na primeira entrada. Dados  $w_j \in Im(T_j), 1 \leq j \leq k, w'_1 \in Im(T_1)$  e  $\lambda \in \mathbb{F}$ , note que, como

$$\begin{aligned} T_1(\sigma_1(w_1) + \lambda\sigma_1(w'_1) - \sigma_1(w_1 + \lambda w'_1)) \\ = T_1(\sigma_1(w_1)) + \lambda T_1(\sigma_1(w'_1)) - T_1(\sigma_1(w_1 + \lambda w'_1)) = 0, \end{aligned}$$

$\exists v \in \mathcal{N}(T_1)$  t.q.  $\sigma_1(w_1 + \lambda w'_1) = \sigma_1(w_1) + \lambda\sigma_1(w'_1) + v$ . Assim,

$$\begin{aligned} \sigma(w_1 + \lambda w'_1, w_2, \dots, w_k) &= \pi(\sigma_1(w_1 + \lambda w'_1) \otimes \sigma_2(w_2) \otimes \cdots \otimes \sigma_k(w_k)) \\ &= \pi((\sigma_1(w_1) + \lambda\sigma_1(w'_1) + v) \otimes \sigma_2(w_2) \otimes \cdots \otimes \sigma_k(w_k)) \end{aligned}$$

Mostremos que  $\tilde{\sigma}$  satisfaz (2). Dados  $v_j \in V_j, 1 \leq j \leq k$ , (3) nos diz que existe  $v'_j \in \mathcal{N}(T_j)$  tal que  $\sigma_j(T_j(v_j)) = v_j + v'_j$ . Então,

$$\begin{aligned} S((T_1 \otimes \cdots \otimes T_k)(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k)) &= S(T_1(v_1) \otimes \cdots \otimes T_k(v_k)) \\ &= \sigma(T_1(v_1), \dots, T_k(v_k)) = \pi(\sigma_1(T_1(v_1)) \otimes \cdots \otimes \sigma_k(T_k(v_k))) \\ &= \pi((v_1 + v'_1) \otimes \cdots \otimes (v_k + v'_k)) = \pi(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k) + \pi(\mathbf{v}) \end{aligned}$$

onde  $\mathbf{v}$  é uma soma de elementos em  $N$ . Isso mostra a validade de (2).

Mostremos a linearidade de  $\sigma$  na primeira entrada. Dados  $w_j \in Im(T_j), 1 \leq j \leq k, w'_1 \in Im(T_1)$  e  $\lambda \in \mathbb{F}$ , note que, como

$$\begin{aligned} T_1(\sigma_1(w_1) + \lambda\sigma_1(w'_1) - \sigma_1(w_1 + \lambda w'_1)) \\ = T_1(\sigma_1(w_1)) + \lambda T_1(\sigma_1(w'_1)) - T_1(\sigma_1(w_1 + \lambda w'_1)) = 0, \end{aligned}$$

$\exists v \in \mathcal{N}(T_1)$  t.q.  $\sigma_1(w_1 + \lambda w'_1) = \sigma_1(w_1) + \lambda\sigma_1(w'_1) + v$ . Assim,

$$\begin{aligned} \sigma(w_1 + \lambda w'_1, w_2, \dots, w_k) &= \pi(\sigma_1(w_1 + \lambda w'_1) \otimes \sigma_2(w_2) \otimes \cdots \otimes \sigma_k(w_k)) \\ &= \pi((\sigma_1(w_1) + \lambda\sigma_1(w'_1) + v) \otimes \sigma_2(w_2) \otimes \cdots \otimes \sigma_k(w_k)) \\ &= \pi((\sigma_1(w_1)) \otimes \sigma_2(w_2) \otimes \cdots \otimes \sigma_k(w_k)) \\ &+ \lambda \pi(\sigma_1(w'_1) \otimes \sigma_2(w_2) \otimes \cdots \otimes \sigma_k(w_k)) + \pi(v \otimes \sigma_2(w_2) \otimes \cdots \otimes \sigma_k(w_k)) \end{aligned}$$



Mostremos que  $\tilde{\sigma}$  satisfaz (2). Dados  $v_j \in V_j, 1 \leq j \leq k$ , (3) nos diz que existe  $v'_j \in \mathcal{N}(T_j)$  tal que  $\sigma_j(T_j(v_j)) = v_j + v'_j$ . Então,

$$\begin{aligned} S((T_1 \otimes \cdots \otimes T_k)(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k)) &= S(T_1(v_1) \otimes \cdots \otimes T_k(v_k)) \\ &= \sigma(T_1(v_1), \dots, T_k(v_k)) = \pi(\sigma_1(T_1(v_1)) \otimes \cdots \otimes \sigma_k(T_k(v_k))) \\ &= \pi((v_1 + v'_1) \otimes \cdots \otimes (v_k + v'_k)) = \pi(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k) + \pi(\mathbf{v}) \end{aligned}$$

onde  $\mathbf{v}$  é uma soma de elementos em  $N$ . Isso mostra a validade de (2).

Mostremos a linearidade de  $\sigma$  na primeira entrada. Dados  $w_j \in Im(T_j), 1 \leq j \leq k, w'_1 \in Im(T_1)$  e  $\lambda \in \mathbb{F}$ , note que, como

$$\begin{aligned} T_1(\sigma_1(w_1) + \lambda\sigma_1(w'_1) - \sigma_1(w_1 + \lambda w'_1)) \\ = T_1(\sigma_1(w_1)) + \lambda T_1(\sigma_1(w'_1)) - T_1(\sigma_1(w_1 + \lambda w'_1)) = 0, \end{aligned}$$

$\exists v \in \mathcal{N}(T_1)$  t.q.  $\sigma_1(w_1 + \lambda w'_1) = \sigma_1(w_1) + \lambda\sigma_1(w'_1) + v$ . Assim,

$$\begin{aligned} \sigma(w_1 + \lambda w'_1, w_2, \dots, w_k) &= \pi(\sigma_1(w_1 + \lambda w'_1) \otimes \sigma_2(w_2) \otimes \cdots \otimes \sigma_k(w_k)) \\ &= \pi((\sigma_1(w_1) + \lambda\sigma_1(w'_1) + v) \otimes \sigma_2(w_2) \otimes \cdots \otimes \sigma_k(w_k)) \\ &= \pi((\sigma_1(w_1)) \otimes \sigma_2(w_2) \otimes \cdots \otimes \sigma_k(w_k)) \\ &+ \lambda \pi(\sigma_1(w'_1) \otimes \sigma_2(w_2) \otimes \cdots \otimes \sigma_k(w_k)) + \pi(v \otimes \sigma_2(w_2) \otimes \cdots \otimes \sigma_k(w_k)) \\ &= \sigma(w_1, w_2, \dots, w_k) + \lambda \sigma(w'_1, w_2, \dots, w_k). \end{aligned}$$

Mostremos que  $\tilde{\sigma}$  satisfaz (2). Dados  $v_j \in V_j, 1 \leq j \leq k$ , (3) nos diz que existe  $v'_j \in \mathcal{N}(T_j)$  tal que  $\sigma_j(T_j(v_j)) = v_j + v'_j$ . Então,

$$\begin{aligned} S((T_1 \otimes \cdots \otimes T_k)(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k)) &= S(T_1(v_1) \otimes \cdots \otimes T_k(v_k)) \\ &= \sigma(T_1(v_1), \dots, T_k(v_k)) = \pi(\sigma_1(T_1(v_1)) \otimes \cdots \otimes \sigma_k(T_k(v_k))) \\ &= \pi((v_1 + v'_1) \otimes \cdots \otimes (v_k + v'_k)) = \pi(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k) + \pi(\mathbf{v}) \end{aligned}$$

onde  $\mathbf{v}$  é uma soma de elementos em  $N$ . Isso mostra a validade de (2).

Mostremos a linearidade de  $\sigma$  na primeira entrada. Dados  $w_j \in Im(T_j), 1 \leq j \leq k, w'_1 \in Im(T_1)$  e  $\lambda \in \mathbb{F}$ , note que, como

$$\begin{aligned} T_1(\sigma_1(w_1) + \lambda\sigma_1(w'_1) - \sigma_1(w_1 + \lambda w'_1)) \\ = T_1(\sigma_1(w_1)) + \lambda T_1(\sigma_1(w'_1)) - T_1(\sigma_1(w_1 + \lambda w'_1)) = 0, \end{aligned}$$

$\exists v \in \mathcal{N}(T_1)$  t.q.  $\sigma_1(w_1 + \lambda w'_1) = \sigma_1(w_1) + \lambda\sigma_1(w'_1) + v$ . Assim,

$$\begin{aligned} \sigma(w_1 + \lambda w'_1, w_2, \dots, w_k) &= \pi(\sigma_1(w_1 + \lambda w'_1) \otimes \sigma_2(w_2) \otimes \cdots \otimes \sigma_k(w_k)) \\ &= \pi((\sigma_1(w_1) + \lambda\sigma_1(w'_1) + v) \otimes \sigma_2(w_2) \otimes \cdots \otimes \sigma_k(w_k)) \\ &= \pi((\sigma_1(w_1)) \otimes \sigma_2(w_2) \otimes \cdots \otimes \sigma_k(w_k)) \\ &+ \lambda \pi(\sigma_1(w'_1) \otimes \sigma_2(w_2) \otimes \cdots \otimes \sigma_k(w_k)) + \pi(v \otimes \sigma_2(w_2) \otimes \cdots \otimes \sigma_k(w_k)) \\ &= \sigma(w_1, w_2, \dots, w_k) + \lambda \sigma(w'_1, w_2, \dots, w_k). \end{aligned}$$