

MS650A - 2S04 - Lista 7

(1) Resolva os seguintes problemas de Cauchy:

$$\begin{array}{llll}
 \text{(a)} \begin{cases} u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0, \\ u(x, 0) = 0, \\ u_t(x, 0) = 1. \end{cases} &
 \text{(b)} \begin{cases} u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0, \\ u(x, 0) = \sin x, \\ u_t(x, 0) = x^2. \end{cases} &
 \text{(c)} \begin{cases} u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0, \\ u(x, 0) = x^3, \\ u_t(x, 0) = x. \end{cases} &
 \text{(d)} \begin{cases} u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0, \\ u(x, 0) = x, \\ u_t(x, 0) = \sin x. \end{cases} \\
 \text{(e)} \begin{cases} u_{tt} - c^2 u_{xx} = x, \\ u(x, 0) = 0, \\ u_t(x, 0) = 3. \end{cases} &
 \text{(f)} \begin{cases} u_{tt} - c^2 u_{xx} = e^x, \\ u(x, 0) = 5, \\ u_t(x, 0) = x^2. \end{cases} &
 \text{(g)} \begin{cases} u_{tt} - c^2 u_{xx} = xe^t, \\ u(x, 0) = \sin x, \\ u_t(x, 0) = 0. \end{cases} &
 \text{(h)} \begin{cases} u_{xx} + 2u_{xy} - 3u_{yy} = 0, \\ u(x, 0) = \sin x, \\ u_y(x, 0) = x. \end{cases}
 \end{array}$$

(2) Exercícios do livro do Edmundo, capítulo 9, do PP 9.1 ao PP 9.40.

(3) Resolva os seguintes problemas:

$$\begin{array}{ll}
 \text{(a)} \begin{cases} u_{tt} = c^2 u_{xx}, & 0 < x < \pi, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = 0, & u_t(x, 0) = 8 \sin^2 x, \\ u(0, t) = 0, & u(\pi, t) = 0. \end{cases} &
 \text{(b)} \begin{cases} u_{tt} = c^2 u_{xx}, & 0 < x < \pi, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = x^3, & u_t(x, 0) = 0, \\ u(0, t) = 0, & u_x(\pi, t) = 0. \end{cases}
 \end{array}$$

(4) Usando coordenadas polares, resolva os problemas

$$\begin{array}{ll}
 \text{(a)} \begin{cases} \nabla^2 u = 0, & 1 < r < 2, \quad 0 < \theta < \pi, \\ u(1, \theta) = \sin \theta, & u(2, \theta) = 0, \\ u(r, 0) = 0, & u(r, \pi) = 0. \end{cases} &
 \text{(b)} \begin{cases} \nabla^2 u = 0, & 1 < r < 2, \quad 0 < \theta < 2\pi, \\ u_r(1, \theta) = \sin \theta, & \\ u_r(2, \theta) = 0. & \end{cases} \\
 \text{(c)} \begin{cases} \nabla^2 u = 0, & r < R, \quad 0 < \theta < \pi, \\ u_r(R, \theta) = 0, & u(r, 0) = 0, \\ u(r, \pi) = 0. & \end{cases}
 \end{array}$$

(5) Usando coordenadas cilíndricas, resolva os problemas

$$\begin{array}{ll}
 \text{(a)} \begin{cases} \nabla^2 u = 0, & r < a, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 < z < h, \\ u(a, \theta, z) = 0, & u(r, \theta, 0) = 0, \\ u(r, \theta, h) = V(r). & \end{cases} &
 \text{(b)} \begin{cases} \nabla^2 u = 0, & r < a, \\ u(a, \theta, z) = V, & 0 < \theta < \pi, \\ u(r, \theta, z) = -V, & \pi < \theta < 2\pi. \end{cases}
 \end{array}$$

(6) Usando coordenadas esféricas, resolva os problemas

$$\begin{array}{ll}
 \text{(a)} \begin{cases} \nabla^2 u = 0, & r < a, \quad 0 \leq \theta \leq \pi, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi \\ u(a, \theta, \phi) = \cos^2 \theta. & \end{cases} &
 \text{(b)} \begin{cases} \nabla^2 u = \frac{1}{\kappa} u_t, & r < a, \quad 0 \leq \theta \leq \pi, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi, \\ u(r, \theta, \phi, 0) = u_0(r), & t = 0, \\ \left(\frac{\partial u}{\partial r} + h(u - u_1) \right)_{r=a} = 0, & (h = \text{cte}). \end{cases}
 \end{array}$$

(7) Usando coordenadas cartesianas, resolva os problemas

$$\text{(a)} \begin{cases} \nabla^2 u = 0, & 0 < x < a, \quad 0 < y < b, \quad 0 < z < c, \\ u(0, y, z) = \sin \frac{\pi y}{b} \sin \frac{\pi z}{c}, & u(a, y, z) = 0, \\ u(x, 0, z) = u(x, b, z) = 0, & \\ u(x, y, 0) = u(x, y, c) = 0. & \end{cases}$$

$$(b) \begin{cases} u_{tt} = c^2 \nabla^2 u, & 0 < x < 1, 0 < y < 1, 0 < z < 1, t > 0, \\ u(x, y, z, 0) = \sin \pi x \sin \pi y \sin \pi z, & u_t(x, y, z, 0) = 0, \\ u(0, y, z, t) = u(1, y, z, t) = 0, \\ u(x, 0, z, t) = u(x, 1, z, t) = 0, \\ u(x, y, 0, t) = u(x, y, 1, t) = 0. \end{cases}$$

(8) Resolva a equação de onda não-homogênea

$$\begin{cases} u_{tt} = c^2 u_{xx} + h, & 0 < x < l, t > 0, \\ u(x, 0) = 0, & u_t(x, 0) = 0, \\ u(0, t) = 0, & u(l, t) = 0, \end{cases}$$

fazendo a mudança de variável $u(x, t) = v(x, t) + U(x)$, e exigindo que $v(x, t)$ satisfaça a equação de onda homogênea e $U(x)$ satisfaça a equação envolvendo o termo não-homogêneo, ou seja, $c^2 U_{xx} + h = 0$, com condições de contorno homogêneas $U(0) = U(l) = 0$.

(9) As vibrações transversais de uma viga de comprimento l são descritas pela equação $u_{tt} + a^2 u_{xxxx} = 0$, ($0 < x < l, t > 0$), onde a é uma constante. Resolva o problema

$$\begin{cases} u_{tt} + a^2 u_{xxxx} = 0, \\ u(x, 0) = f(x), & u_t(x, 0) = g(x), & 0 \leq x \leq l, \\ u(0, t) = u(l, t) = 0, & u_{xx}(0, t) = u_{xx}(l, t) = 0. \end{cases}$$

(10) Resolva o problema (k é uma constante)

$$\begin{cases} \nabla^4 u = k, & -a/2 < x < a/2, 0 < y < b, \\ u(-a/2, y) = u(a/2, y) = 0, & u_{xx}(-a/2, y) = u_{xx}(a/2, y) = 0, \\ u(x, 0) = u(x, b) = 0, & u_{yy}(x, 0) = u_{yy}(x, b) = 0. \end{cases}$$

Algumas Respostas (Obs: sem garantia; use-as por sua conta e risco)

$$(3-a) u = \cos(\pi ct/2) \sin(\pi x/2), (3-b) u = \sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} \frac{24}{\pi n^2} \left(\pi^2 - \frac{4}{n^2} \right) \sin(n\pi/2) \cos(nct/2) \sin(nx/2),$$

$$(4-a) u = ((4-r^2)/3r) \sin \theta, (4-b) u = -((4+r^2)/3r) \sin \theta + \text{constante}, (4-c) u = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n+1} R^{1-n}}{n^2} r^n \sin n\theta,$$

$$(5-a) u = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} A_{mn} J_n(\alpha_{mn} r/a) \sinh(\alpha_{mn} z/a) \cos m\theta, A_{mn} = \frac{4\delta_{n0}}{a^2 J_1^2(\alpha_{0n}) \sinh(\alpha_{0n} h/a)} \int_0^a V(r) J_0(\alpha_{0n} r/a) r dr,$$

$$(5-b) u = \frac{4V}{\pi} \sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{r}{a} \right)^n \sin n\theta, (6-a) u = 1/3 + (2r^2/3a^2) P_2(\cos \theta), (6-b) u = u_1 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \frac{\sin k_n r}{k_n r} e^{-\kappa k_n^2 t},$$

$$A_n = \frac{4k_n^3 \int_0^a [u_0(r) - u_1] r^2 j_0(k_n r) dr}{2k_n a - \sin 2k_n a}, \frac{\tan k_n a}{k_n a} = \frac{1}{1 - ha}, j_l(x) = \sqrt{\frac{\pi}{2x}} J_{l+1/2}(x)$$

$$(7-a) u = \frac{\sinh[(\pi/b)^2 + (\pi/c)^2]^{1/2} (a-x)}{\sinh[(\pi/b)^2 + (\pi/c)^2]^{1/2} a} \sin \frac{\pi y}{b} \sin \frac{\pi z}{c}, (7-b) u = \sin \pi x \sin \pi y \sin \pi z \cos \sqrt{3\pi} ct,$$

$$(8) u = - \sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} \left(\frac{4l^2 h}{c^2 \pi^3 n^3} \right) \cos \frac{n\pi ct}{l} \sin \frac{n\pi x}{l} + \frac{hx}{2c^2} (l-x), (9) u = \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos a(n\pi/l)^2 t + b_n \sin a(n\pi/l)^2 t] \sin \frac{n\pi x}{l},$$

$$a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx, b_n = \frac{2}{al} \left(\frac{l}{n\pi} \right)^2 \int_0^l g(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx, (10) u = \frac{4kb^4}{\pi^5} \sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} \frac{1}{n^5} \left[1 - \frac{v_n(x)}{1 + \cosh \frac{n\pi a}{b}} \right] \sin \frac{n\pi y}{b},$$

$$v_n(x) = 2 \cosh \frac{n\pi a}{2b} \cosh \frac{n\pi x}{b} + \frac{n\pi a}{2b} \sinh \frac{n\pi a}{2b} \cosh \frac{n\pi x}{b} - \frac{n\pi x}{b} \sinh \frac{n\pi a}{b} \cosh \frac{n\pi a}{2b}$$