

Nome: _____

RA: _____

Métodos Matemáticos I (F520/MS550) - Exame

12 de julho de 2010

Resolva quatro questões dentre as seis apresentadas abaixo.

1. (2,5 pontos) Considere o campo vetorial dado, em coordenadas esféricas, por

$$\mathbf{F} = \frac{2P \cos \theta}{r^3} \hat{\mathbf{r}} + \frac{P \sin \theta}{r^3} \hat{\boldsymbol{\theta}}, \quad r \geq P/2,$$

onde $P > 0$. Calcule $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ onde C é o segmento de reta orientado que liga A a B , onde A e B são dados por $A = P(0, 0, -1)$ e $B = P(1, 1, 1)$ em coordenadas cartesianas.

2. (2,5 pontos) Determine a solução geral da equação diferencial

$$x(x-1)y'' + 3xy' + y = 0$$

para $x \in (0, 1)$.

3. (2,5 pontos) Considere a equação diferencial

$$x y''(x) + y'(x) = f(x),$$

sujeita às condições de contorno $y(1) = y(e) = 0$.

(a) Ache a função de Green para tal problema.

(b) Resolva este problema para $f(x) = 1/x$.

4. Considere a equação diferencial $y'' - y' + \lambda y = 0$ no intervalo $[0, 1]$.

(a) (2 pontos) Determine os autovalores e autofunções correspondentes para o problema de Sturm-Liouville associado à EDO acima sujeita às condições de contorno $y(0) = y(1) = 0$.

(b) (0.5 pontos) Escreva a condição de ortogonalidade entre essas autofunções.

5. (2,5 pontos) Seja P_n o n -ésimo polinômio de Legendre. Mostre que

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{2} P_n(x) P_n(x') = \delta(x-x'),$$

$x, x' \in (-1, 1)$. Dica: Lembre-se que os polinômios de Legendre formam um conjunto ortogonal completo, com $\int_{-1}^1 P_n(x) P_m(x) dx = \frac{2}{2n+1} \delta_{nm}$, etc.

6. (2,5 pontos) Prove que qualquer solução da equação de Airy, $y''(x) + xy(x) = 0$, tem um número infinito de zeros em $(0, \infty)$ e no máximo um zero em $(-\infty, 0)$.

Fórmulas possivelmente úteis:

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial r} \hat{\mathbf{r}} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \hat{\boldsymbol{\theta}} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \hat{\boldsymbol{\varphi}}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{V} = \frac{1}{r^2 \sin \theta} \left[\sin \theta \frac{\partial}{\partial r} (r^2 V_r) + r \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta V_\theta) + r \frac{\partial V_\varphi}{\partial \varphi} \right]$$

$$\nabla \times \mathbf{V} = \frac{1}{r^2 \sin \theta} \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{r}} & r \hat{\boldsymbol{\theta}} & r \sin \theta \hat{\boldsymbol{\varphi}} \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \theta} & \frac{\partial}{\partial \varphi} \\ V_r & r V_\theta & r \sin \theta V_\varphi \end{vmatrix}$$

coord. esféricas
