



1. Seja (X, \mathcal{B}, μ) um espaço de probabilidade (i.e. um espaço de medida tal que $\mu(X) < \infty$). Dado $\varphi \in L^p(\mu)$, com $1 < p \leq \infty$, mostre que:
 $L^\infty(\mu) \subseteq L^p(\mu) \subset L^1(\mu)$.
Dica: considere separadamente os casos $1 < p < \infty$ e $p = \infty$.
2. Mostre que se um espaço normado possui base de Schauder, então ele é separável.
3. Mostre que normas equivalentes em um espaço vetorial X induzem a mesma topologia.
4. Considere o conjunto das matrizes reais $m \times n$ (com m e n fixos).
 - a) Mostre que o espaço M formado por essas matrizes formam um espaço vetorial mn -dimensional.
 - b) Mostre que todas as normas em M são equivalentes.
 - c) Descreva explicitamente as normas $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ e $\|\cdot\|_\infty$.
 - d) M é isomorfo a algum \mathbb{R}^d ? Prove se sim ou se não.
5. Prove que se E e F forem espaços normados de mesma dimensão finita, sobre o mesmo corpo, então E e F serão isomorfos.
6. Seja $T : E \rightarrow F$ um operador linear. Mostre que a imagem de um subespaço V de E é um espaço vetorial e a imagem inversa de um subespaço W de F também o é.
7. Seja o espaço vetorial das matrizes reais 2×2 e defina $T : E \rightarrow E$ por $Tx = bx$, onde $b \in E$ é fixo e bx denota a multiplicação usual de matrizes.
 - a) Mostre que T é linear.
 - b) Sob que condições existe T^{-1} ?
8. Seja $\mathcal{P}(t)$ o espaço vetorial dos polinômios em um intervalo $[a, b]$. Podemos definir um operador (*derivação*) T agindo em $\mathcal{P}(t)$, dado por
$$Tx(t) = x'(t),$$
onde $x'(t)$ denota a derivada de $x(t)$.
 - a) Mostre que T é linear.
 - b) Existe T^{-1} ?
9. Seja E e F espaços normados. Mostre que um operador linear $T : E \rightarrow F$ é limitado se, e somente se, leva conjuntos limitados de E em conjuntos limitados de F .