



1. Mostre que, se  $T$  for uma contração, então  $T^n$ , para  $n \in \mathbb{N}$  será uma contração. Mas se  $T^n$  for uma contração para algum  $n > 1$ , então não necessariamente  $T$  será contração.
2. Dado um espaço métrico completo  $X$  e  $g : X \rightarrow X$ , mostre que se  $g$  for continuamente diferenciável e  $|g'(x)| \leq k < 1$ , onde  $k$  é a constante de Lipschitz, então  $x_n = g(x_{n-1})$  converge.
3. Encontre todas condições iniciais tais que o problema do valor inicial  $tx' = 2x, x(t_0) = x_0$ 
  - a) não tem solução;
  - b) mais de uma solução;
  - c) solução única.
4. Obtenha a Desigualdade de Schwarz da Desigualdade de Bessel.
5. Mostre que se  $x \perp y$  em um espaço com produto interno, então

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2.$$

6. Seja  $(e_k)$  uma sequência ortonormal em um espaço com produto interno  $X$ . Mostre que para quaisquer  $x, y \in X$ ,

$$\sum_{k=1}^{\infty} |\langle x, e_k \rangle \langle y, e_k \rangle| \leq \|x\| \|y\|.$$

7. Mostre que, em um espaço de Hilbert  $H$ , convergência de  $\sum \|x_j\|$  implica convergência de  $\sum x_j$ .
8. Mostre que a equação diferencial de Legendre pode ser escrita como

$$[(1 - t^2)P_n'] = -n(n + 1)P_n. \quad (1)$$

Multiplicando a equação (1) por  $P_m$ . Em seguida, multiplique a correspondente equação obtida para  $P_m$  por  $-P_n$  e some as duas equações. Integrando o resultado de  $-1$  a  $1$ , mostre que  $(P_n)$  é uma sequência ortogonal em  $L^2[-1, 1]$ .

9. Mostre que o espaço dual do espaço das sequências reais  $\ell^2$  é o próprio  $\ell^2$ .
10. Mostre que todo espaço de Hilbert  $H$  é isomorfo ao seu bidual  $H'' = (H')'$ .
11. Verifique que o conjunto funções reais

$$f_0(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \quad f_n(t) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos(nt), \quad g_n(t) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin(nt), \quad n \in \mathbb{N},$$

é um sistema ortonormal em  $L^2[0, 2\pi]$ .