

Estatística para Biologistas (ME 480)  
Primeiro semestre de 2013  
Prova II  
Data: 26/06/2013

Nome: \_\_\_\_\_ RA: \_\_\_\_\_

Leia atentamente as instruções abaixo:

- Coloque seu nome completo e RA em todas as folhas que você recebeu, inclusive nesta.
- Utilize somente um dos lados de cada folha de resposta.
- Leia atentamente cada uma das questões.
- Enuncie, claramente, todos os resultados que você utilizar.
- Justifique, adequadamente, seus desenvolvimentos, sem, no entanto, escrever excessivamente.
- O(a) aluno(a) só poderá sair da sala após as 10h30, mesmo que já tenha finalizado a prova. Após a saída do(a) primeiro(a) aluno(a) não será permitido a entrada de nenhum(a) outro(a) aluno(a).
- Não é permitido empréstimo de material.
- Não serão dirimidas dúvidas de quaisquer natureza, após os 20 minutos iniciais.
- Resolva a prova, preferencialmente, à caneta, e procure ser organizado(a). Se fizer à lápis, destaque, à caneta, sua resposta.
- O(a) aluno(a) deverá portar sua carteira de estudante e apresentá-la, quando for solicitada sua assinatura.
- Contestações a respeito da nota, só serão consideradas se estiverem por escrito.
- A nota do aluno(a) será  $\frac{NP}{NT} \times 10$ , em que NP é o número de pontos obtidos na prova e NT é o número total de pontos da prova.
- Os resultados numéricos finais devem ser apresentados com duas casas decimais, apenas.
- A prova terá duração de 120 minutos, das 10h às 12h, improrrogáveis.

Faça uma excelente Prova!!

1. Seja  $X$  uma variável aleatória contínua tal que sua fdp é dada por:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < -1/2 \text{ ou se } x > 1/2 \\ C(1+x) & \text{se } -1/2 \leq x < 0 \\ C(1-x) & \text{se } 0 \leq x \leq 1/2 \end{cases}$$

Responda os itens:

- a) Determine a constante  $C$  para que a função acima seja, de fato, uma fdp (150 pontos).
  - b) Obtenha  $F(x)$  (ou seja, a função de distribuição acumulada) e calcule  $P(X \leq 1/3)$  (250 pontos).
  - c) Calcule  $\mathcal{E}(X)$  e  $Var(X)$  (200 pontos).
2. Em um estudo dos efeitos da cocaína no período pré-natal sobre bebês, foram obtidos os seguintes dados amostrais dos pesos ao nascer:  $n = 17$ ,  $\bar{x} = 2850$  g,  $s = 637$  g. Note que, neste caso, a variância populacional é desconhecida. Desejamos fazer inferência com respeito à média populacional ( $\mu$ ). Responda as perguntas:
- a) Construa um IC(95%) para a média populacional ( $\mu$ ). O grupo de bebês é considerado doente, se o peso médio for menor que 2300 g. Neste caso, qual seria sua conclusão sobre este grupo, com base no intervalo de confiança? Justifique, adequadamente, sua resposta (200 pontos).
  - b) Qual seria o tamanho da amostra de sorte que o erro da estimativa não seja superior à 350g, com uma probabilidade de 0,95. Use os dados do problema (250 pontos).
3. Um pesquisador desenvolveu um novo remédio para tratar certo tipo de alergia. Ele tem certeza de que o remédio é eficaz em 70 % ou 90% dos casos. Ou seja, ele deseja testar se  $H_0 : p = 0,70$  vs  $H_1 : p = 0,90$ , em que “p” é a proporção de pessoas em que o remédio é eficaz. A regra de decisão sempre será: rejeita-se  $H_0$  se o valor da estatística calculada exceder um valor crítico. Responda os itens:
- a) Suponha que a regra de decisão seja: rejeita-se  $H_0$  se a proporção amostral for maior que 0,80. Para uma amostra de tamanho  $n = 35$ , obtenha as probabilidades de se cometer o erro do tipo I ( $\alpha$ ), de se cometer o erro do tipo II ( $\beta$ ) bem como o poder observado ( $\psi$ ). (200 pontos)
  - b) Como deveria ser a regra de decisão para o que a probabilidade de se cometer o erro do tipo I ( $\alpha$ ) seja de 0,01 (200 pontos).
  - c) Com a regra de decisão estabelecida no item b), determine o tamanho da amostra de sorte que o poder observado seja igual à 0,95 (200 pontos).
4. Os tempos de vida de componentes eletrônicos (em horas) das marcas  $A$  e  $B$ , têm distribuição normal com variâncias conhecidas, sendo  $\sigma_A^2 = 34,56$  e  $\sigma_B^2 = 36,54$ . Com o intuito de comparar se as médias dos tempos de vida são iguais ou não, realizou-se um experimento em  $n = 19$  componentes da marca  $A$  e  $m = 15$  componentes da marca  $B$ . Os resultados foram  $\bar{x}_A = 23,5$ ,  $\bar{x}_B = 25,4$ , em que os índices “ $A$ ” e “ $B$ ” indicam que os resultados se referem as marcas  $A$  e  $B$ , respectivamente. Responda os itens:
- a) Construa um IC(99%) para  $\mu_A - \mu_B$ . Com base neste IC, o que você pode concluir em relação às hipóteses de interesse? Justifique, adequadamente, sua resposta (250 pontos)
  - b) Teste, ao nível de significância ( $\alpha = 0,01$ ), as hipóteses de interesse. Calcule o nível descritivo (pvalor) associado ao teste. Qual sua conclusão? Ela coincidiu com a conclusão obtida no item a)? O resultado era esperado? Justifique, adequadamente, sua resposta (300 pontos).

## Formulário

1. Variáveis aleatórias contínuas

$$E(X^k) = \int_{-\infty}^{\infty} x^k f(x) dx, k = 1, 2, \dots$$

$$Var(X) = E(X^2) - E^2(X)$$

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(z) dz.$$

2. Intervalo de confiança para  $(\mu)$  com variância  $(\sigma^2)$  desconhecida.

$$IC(\mu, \gamma\%) = \left[ \bar{X} - t_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{S^2}{n}}; \bar{X} + t_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{S^2}{n}} \right], S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.$$

3. Teste de hipóteses para uma única proporção:  $H_0 : p = p_0$  vs  $H_1 : p > p_0$  ou  $H_1 : p < p_0$  ou  $H_1 : p \neq p_0$

Estatística do teste:

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}}$$

4. Intervalo de confiança para diferença de médias com variâncias conhecidas:

$$IC(\mu_A - \mu_B, \gamma\%) = \left[ (\bar{X}_A - \bar{X}_B) - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{\sigma_A^2}{n} + \frac{\sigma_B^2}{m}}; (\bar{X}_A - \bar{X}_B) + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{\sigma_A^2}{n} + \frac{\sigma_B^2}{m}} \right]$$

5. Teste de hipóteses para diferenças de médias com variâncias conhecidas:  $H_0 : \mu_A = \mu_B$  vs  $H_1 : \mu_A < \mu_B$  ou  $H_1 : \mu_A > \mu_B$  ou  $H_1 : \mu_A \neq \mu_B$ .

Estatística do teste:

$$Z = \frac{\bar{X}_A - \bar{X}_B}{\sqrt{\frac{\sigma_A^2}{n} + \frac{\sigma_B^2}{m}}}$$